

MBL/WHOI



0 0301 0014112 3



I

FUNGHI MANGERECCHI E VELENOSI

DELL' EUROPA MEDIA

CON SPECIALE RIGUARDO

A QUELLI CHE CRESCONO NEL TRENTINO
E NELL' ALTA ITALIA

PER CURA

DELL' AB. G. BRESADOLA

CON 112 TAVOLE CROMOLITOGRAFICHE E 1 FOTOTIPIA



ULRICO HOEPLI

EDITORE LIBRAIO DELLA R. CASA

MILANO

1899.

.....

.....

.....

I

FUNGHI MANGERECCI E VELENOSI

DELL' EUROPA MEDIA

CON SPECIALE RIGUARDO

A QUELLI CHE CRESCONO NEL TRENTINO
E NELL' ALTA ITALIA

PER CURA

DELL' AB. G. BRESADOLA

CON 112 TAVOLE CROMOLITOGRAFICHE E 1 FOTOTIPIA



ULRICO HOEPLI

EDITORE LIBRAIO DELLA R. CASA

MILANO

1899.

Proprietà letteraria.

ALL' ILLUSTRISSIMO SIGNOR BARONE

MASSIMILIANO DE MERSI

PRESIDENTE DELLA SEZIONE DI TRENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
D'AGRICOLTURA ECC. ECC.

Illustrissimo Signor Barone!

*A Lei, illustrissimo Signor Barone, che mi eccitò a pubblicare i **Funghi mangerecci e velenosi** con speciale riguardo al nostro Trentino e ne promosse, a vantaggio del nostro popolo, la stampa a mezzo della Sezione di Trento del Consiglio provinciale d'Agricoltura, di cui è degnissimo ed altivissimo Preside, presento quest'edizione separata degli stessi, che esce ora riveduta e disposta in ordine sistematico, e La prego di accettarla benevolmente in segno di ossequio e di riconoscenza.*

Di V. S. ill.ma

Trento, marzo 1899.

Illustrissimo

GIACOMO BRESADOLA

Indice delle materie.



	<i>Pag.</i>
Prospetto sistematico delle specie descritte	1
Prefazione	1

Parte generale.

Natura e forma dei Funghi	7
Del Micelio	8
Del Ricettacolo	8
Norme per la raccolta, preparazione e conservazione dei Funghi	11
Cueinatura dei Funghi	12

Parte speciale.

I. IMENOMICETEE	17
Famiglia delle Agaricacee	17
Genere Amanita	17
Genere Lepiota	27
Genere Armillaria	30
Genere Tricholoma	36
Genere Clitocybe	45
Genere Collybia	52
Genere Pleurotus	53
Genere Hygrophorus	55
Genere Lactarius	56
Genere Russula	63
Genere Cantharellus	73
Genere Craterellus	75

	<i>Pag.</i>
Genere Marasmius	76
Genere Volvaria	77
Genere Entoloma	79
Genere Clitopilus	80
Genere Pholiota	81
Genere Cortinarius	86
Genere Psalliota	87
Genere Coprinus	92
Famiglia delle Poliporacee	95
Genere Boletus	95
Genere Polyporus	102
Famiglia delle Idnacee	106
Genere Hydnum	106
Famiglia delle Clavariacee	108
Genere Clavaria	108
Famiglia delle Tremellacee	111
Genere Guepinia	111
II. GASTEROMICETEE	112
Famiglia delle Licoperdacee	112
Genere Lycoperdon	112
Famiglia delle Imenogastracee	114
Genere Rhizopogon	114
III. DISCOMICETEE	116
Famiglia delle Elvellacee	116
Genere Marchella	116
Genere Mitrophora	119
Genere Gyromitra	120
IV. TUBEROIDEE	123
Famiglia delle Tuberacee	123
Genere Tuber	123
 Indice alfabetico dei nomi scientifici e delle tavole	 127
Indice alfabetico dei nomi italiani, vernacoli, francesi e tedeschi	131



Prospetto sistematico

delle specie di Funghi descritte in quest'opera.



FUNGACEE Linn. (FUNGHI).

Piante parassite o saprofiti, cellulari, da una a più cellule, prive di clorofilla, composte di una parte vegetativa (plasmidio o micelio) e d'una parte fruttifera (ricettacolo); organi della fecondazione (sessuali) noti soltanto in qualche gruppo. ¹⁾

COORTE I. — EUMICETEE.

Funghi con micelio, cioè generati dalle spore, le quali producono dei filamenti a cellule allungate (micelio), dal cui accrescimento ed intreccio si forma il ricettacolo.

Classe I. — Basidiomicetee De Bary

Funghi con imenio costituito da cellule cilindriche, clavate, obovate o globose, dette emibasidii o basidii, colla produzione delle spore sempre esterna; basidii continui o settati trasversalmente o verticalmente, portanti all'apice o ai setti un numero vario (all'apice generalmente 4, ai setti uno per setto) di tubetti aghiformi, detti sterimmi, più o meno lunghi, talora anche puntiformi, alla sommità dei quali si formano le spore.

Ordine I. — Imenomicetee Fr.

Funghi carnosì, membranacei, coriacei, sugherosi, legnosi o gelatinosi, per lo più grandi e terrestri, coll'imenio esterno, di forma

¹⁾ Per l'intelligenza dei termini *tecnicì* veggasi **Parte generale**, pag. 7-11.

varia, lamellosa, tubulosa, aculeata o a superficie liscia, costituito da basidii generanti all'apice o ai lati mediante i sterimmi da 2-8, generalmente 4 spore; spore di varia forma e colore, continue o rarissimamente settate.

Famiglia I. — Agaricacee Fr.

Funghi carnosì, carnosò tenaci, membranacei o coriacei, forniti di cappello e gambo o raramente privi di quest'ultimo, con imenio infero, formato da lamelle distese a forme di raggio dal gambo verso il margine del cappello; lamelle costituite da un tessuto a cellule allungate (ife), ai cui lati si sviluppano i basidii, per lo più a 4 sterimmi, in direzione perpendicolare allo stesso.

SERIE I. **Leucospore.** Spore bianche o pallide, di varia forma, ellittiche, ovate, cilindriche, più raramente globose o angolate, lisce o ad episporio granuloso, tuberculato o aculeato.

Genere I. Amanita Pers.

Amanita caesarea Scop.	Pag. 17	Tavola	I
ovoidea Bull.	» 18	»	II
phalloides Fr.	» 19	III
verna Bull.	» 20	»	IV
mappa Batsch.	» 21	V
muscaria Linn.	» 22	»	VI
pantherina De C.	» 23	»	VII
solitaria Bull.	» 23	VIII
rubescens Fr.	» 24	»	IX
spissa Fr.	» 25	»	X
aspera Fr.	» 26	XI
vaginata Bull.	» 26	»	XII

Genere II. Lepiota Fr.

Lepiota procera Scop.	Pag. 27	Tavola	XIII
excoriata Schaeff.	» 28	»	XIV
naucina Fr.	» 29	»	XV

Genere III. Armillaria Fr.

Armillaria robusta Alb. et Schw.	Pag. 30	Tavola	XVI
caligata Viv.	» 31	»	XVII

<i>Armillaria aurantia</i> Schaeff.	Pag. 31	Tavola XVIII
» <i>imperialis</i> Fr.	32	XIX
» <i>mellea</i> Wahl.	34	XX

Genere IV. *Tricholoma* Fr.

<i>Tricholoma acerbum</i> Bull.	Pag. 36	Tavola XXI
» <i>russula</i> Schaeff.	37	XXII
» <i>Columbetta</i> Fr.	» 38	XXIII
» <i>terreum</i> Schaeff.	» 38	XXIV
» <i>trigrinum</i> Schaeff.	» 39	XXV
» <i>virgatum</i> Fr.	» 40	XXVI
» <i>sulphureum</i> Bull.	» 40	XXVII
» <i>Georgi</i> Clas.	41	XXVIII
» <i>goniospermum</i> Bres.	» 42	XXIX
» <i>nudum</i> Bull.	» 43	XXX
» <i>enista</i> Fr.	44	XXXI
» <i>grammopodium</i> Bull.	» 44	XXXII

Genere V. *Clitocybe* Fr.

<i>Clitocybe nebularis</i> Batsch	Pag. 45	Tavola XXXIII
» <i>conglobata</i> Vitt.	» 46	XXXIV
» <i>cinerascens</i> Bull.	» 47	XXXV
» <i>cartilaginea</i> Bull.	» 48	XXXVI
» <i>connata</i> Schum.	» 48	XXXVII
» <i>infundibuliformis</i> Bull.	» 49	XXXVIII
» <i>geotropa</i> Bull.	» 50	XXXIX
» <i>candida</i> Bres.	» 51	XL

Genere VI. *Collybia* Fr.

<i>Collybia dryophila</i> Bull.	Pag. 52	Tavola XLI
---------------------------------	---------	------------

Genere VII. *Pleurotus* Fr.

<i>Pleurotus fuscus</i> (Batt.) Bres.	Pag. 53	Tavola XLII
» <i>ostreatus</i> Jacq.	» 54	XLIII

Genere VIII. *Hygrophorus* Fr.

<i>Hygrophorus pratensis</i> Pers.	Pag. 55	Tavola LIX
» <i>virgineus</i> Wulf.	» 55	LX

Genere IX. *Lactarius* Fr.

<i>Lactarius controversus</i> Pers.	Pag. 56	Tavola LXI
<i>insubus</i> Fr.	57	» LXII
<i>aurantiacus</i> Pers.	58	» LXIII
<i>deliciosus</i> Linn.	59	LXIV
<i>sanguifluus</i> Paul.	60	» LXV
<i>volemus</i> Fr.	61	LXVI
<i>vollerens</i> Fr.	62	» LXVII

Genere X. *Russula* Pers.

<i>Russula delicia</i> Fr.	Pag. 63	Tavola LXVIII
<i>virescens</i> Schaeff.	64	LXIX
<i>lepida</i> Fr.	65	LXX
<i>cyanoxantha</i> Schaeff.	66	» LXXI
<i>vesca</i> Fr.	66	LXXII
<i>emetica</i> Fr.	67	» LXXIII
<i>integra</i> Linn.	68	LXXIV
<i>veterosa</i> Fr.	69	LXXV
<i>alutacea</i> Fr.	69	LXXVI
<i>grisea</i> Pers.	70	LXXVII
<i>aurata</i> Fr.	71	» LXXVIII
<i>lutea</i> Fr.	72	LXXIX

Genere XI. *Cantharellus* Adans.

<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.	Pag. 73	Tavola LXXX
<i>lutescens</i> Pers.	» 74	LXXXI
<i>clavatus</i> Pers.	74	LXXXII

Genere XII. *Craterellus* Fr.

<i>Craterellus cornucopioides</i> Pers.	Pag. 75	Tavola LXXXIII
---	---------	----------------

Genere XIII. *Marasmius* Fr.

<i>Marasmius oreades</i> Bolt.	Pag. 76	Tavola LXXXIV
--------------------------------	---------	---------------

SERIE II. **Rodospore.** — Spore rosee o roseo-ferruginee, ellittiche, fusoides o per lo più poligonali, 4-6 angolate, lisce.

Genere XIV. **Volvaria** Fr.

Volvaria speciosa Fr.	Pag. 77	Tavola	XLIV
» glojocephala Dec.	78		XLV

Genere XV. **Eutoloma** Fr.

Eutoloma clypeatum Linn.	Pag. 79	Tavola	XLVI
--------------------------	---------	--------	------

Genere XVI. **Clitopilus** Fr.

Clitopilus prunulus Scop.	Pag. 80		XLVII
---------------------------	---------	--	-------

SERIE III. — **Ocrospore.** — Spore ocracee o ferruginascenti, ellittiche, reniformi, amigdaliformi, ovate, angolate o più spesso a apispurio granuloso o tuberculato.

Genere XVII. **Pholiota** Fr.

Pholiota caperata Pers.	Pag. 81	Tavola	XLVIII
» praecox Pers.	82		XLIX
» Aegirita (Porta) Brig.	83	»	L
» mutabilis Schaeff.	85	»	LI

Genere XVIII. **Cortinarius** Fr.

Cortinarius firmus Fr.	Pag. 86	Tavola	LVII
------------------------	---------	--------	------

SERIE IV. — **Melanospore.** — Spore foseo-porporine o nere, ellittiche, fusoidee, amigdaliformi o ovato-troncate, lisce.

Genere XIX. **Psalliota** Fr.

Psalliota arvensis Schaeff.	Pag. 87	Tavola	LII
» campestris Linn.	» 88	»	LIII
» » var. edulis Vitt.	Pag. 90	»	LIV
» pudica Viv.	Pag. 91	»	LV

Genere XX. **Coprinus** Pers.

Coprinus atramentarius Bull.	Pag. 92	Tavola	LVI
------------------------------	---------	--------	-----

Genere XXI. **Gomphidius** Fr.

Gomphidius viscidus Linn. Pag. 94 Tavola LVIII

Famiglia II. — **Poliporacee** Fr.

Funghi carnosì, carnosò-tenaci, coriacei, sugherosi o legnosi, con imenio tubuloso, cioè formato da tubuli liberi o saldati insieme, le cui pareti interne sono tappezzate dallo strato dei basidii (per lo più a 4 sterimmi) e cistidii; pori (bocche dei tubuli) rotondi, sinuati, allungati o angolati; spore bianche o ocracee di forma varia, ovata, cilindrica, a mandorla-allungata, globosa, lisce, raramente aculeate o granulose.

Genere XXII. **Boletus** Dill.

Boletus luteus Linn. Pag. 95 Tavola LXXXV
elegans Schum. » 96 LXXXVI
granulatus Linn. » 97 LXXXVII
edulis Bull. » 98 LXXXVIII
aereus Bull. » 99 LXXXIX
Satanas Lenz. » 99 XC
luridus Schaefl. » 100 XCI
scaber Fr. » 101 XCII
versipellis Fr. » 102 XCIII

Genere XXIII. **Polyporus** Mich.

Polyporus ovinus (Schaefl.) Fr. Pag. 103 Tavola XCIV
scobinaceus (Cum.) Bres. Pag. 104 XCV
confluens (Alb. et Schw.) Fr. Pag. 104 XCVI
frondosus (Fl. D.) Fr. Pag. 105 Tavola XCVII e XCVII bis

Famiglia III. — **Idiacee** Fr.

Funghi carnosì, carnosò-tenaci, coriacei o legnosi con imenio intero, formato da aculei, denti, tubercoli, creste o papille, tappezzati dai basidii eccettuata le punte; basidii a 4 sterimmi; spore bianche, gialliccie o ferrugineo-fosche, di forma variabile, nelle specie maggiori globoso-angolate con episporio granulato.

Genere XXIV. *Hydnum* Linn.

<i>Hydnum imbricatum</i> Linn.	Pag. 106	Tavola	XCVIII
» <i>repandum</i> Linn.	» 107	»	XCIX

Famiglia IV. — **Clavariacee** Corda.

Funghi carnosì, carnosò-fibrosi o carnosò-coriacei, ramificati o clavati con imenio non distinto dal ricettacolo, disteso su tutta la superficie dei rami o soltanto da un lato degli stessi; basidii a 4 sterimmi; spore gialle o bianche, di varia forma, per lo più allungate, lisce, raramente ad episporio granuloso o aculeato.

Genere XXV. *Clavaria* Vaill.

<i>Clavaria flava</i> Schaeff.	Pag. 108	Tavola	C
» <i>botrytis</i> Pers.	» 109	»	CI
» <i>aurea</i> Schaeff.	» 110	»	CII

Famiglia V. — **Tremellacee** Fr.

Funghi gelatinosi o cartilagineo-gelatinosi, di forma varia, composti di un tessuto di ife ramosè, strette, con imenio esterno, in alcuni infero o laterale, nei più disteso su tutta la superficie; basidii varianti, clavati e all'apice bisterimmi, settati, coi sterimmi ai setti, o globoso-ovati, settati verticalmente a due sterimmi o a croce con quattro sterimmi, spore bianche o gialliccie, globose, cilindricocurve, continue o più raramente settate.

Genere XXVI. *Guepinia* Fr.

<i>Guepinia rufa</i> (Jacq.) Pat.	Pag. 111	Tavola	CIII
-----------------------------------	--------------------	--------	------

Ordine II. — **Gasteromiceteæ** Willd. em.

Funghi carnosì, carnosò-tenaci, membranacei o coriacei, terrestri, quasi sotterranei o più raramente lignicoli, di forma varia, con imenio interno, inchiuso nel peridio, costituito da basidii che generano all'apice le spore; spore globose, allungate, fusoidee, jaline o colorate, lisce, tubercolate o aculeate.

Famiglia VI. — **Licoperdacee** Ehrb. em.

Funghi terrestri o raramente quasi sotterranei, globosi o piriformi, sessili o stipitati, con peridio membranaceo o coriaceo, che si apre alle sommità con orificio regolare o lacerato; gleba carnosocaseosa o fioccosa, poi polveracea; spore bianche o colorate, globose o ellittiche, lisce, granulose o echinulate.

Genere XXVII. **Lycoperdon** Tourn.

Lycoperdon Bovista Linn.	Pag. 112	Tavola	CX
» caelatum Bull.	» 113		CXI

Famiglia VII. — **Imenogastracee** Vitt.

Funghi carnosotenaci o carnosocoriacei, sotterranei ed a perfetto sviluppo scoperti nella parte superiore o anche intieramente, di forma tuberosa, con peridio o raramente senza, sempre chiuso quando è presente, con gleba carnosotenace o gelatinosa, fornita di cellule, le quali sono tappezzate dall'imenio, costituito dai basidii; spore bianche o gialliccie, globose, fusoides o allungate, lisce o verrucose.

Genere XXVIII. **Rhizopogon** Fr.

Rhizopogon rubescens Tul.	Pag. 115	Tavola	CXII fig. 1.
---------------------------	--------------------	--------	--------------

Classe II. — **Ascomicetee** De Bary.

Funghi con imenio costituito da aschi (teche), cioè da cellule di varia forma, globosa, cilindracea, clavata ecc. generanti internamente le spore in numero vario (generalmente 8); spore di varia forma che germinano uscite dall'asco, il quale si apre alla sommità mediante foro o opercolo.

Ordine III. — **Discomicetee** Fr.

Funghi carnosì, carnosoceracci, carnosocoriacei o membranacei, con ricettacolo di varia forma, a mitra, a clava, a cupola, stipitato o sessile; imenio a pieno sviluppo sempre esteriore costituito da uno strato di aschi cilindracei o clavati, contenenti generalmente 8 spore, raramente meno o più; spore di varia forma, ialine o colorate, continue o settate, lisce o aculeate o longitudinalmente rugoso-striate.

Famiglia VIII. — Elvellacee Schwartz.

Funghi carnosi o carnosio-ceracei, con ricettacolo verticale, mitrato (cappello, clavato o capitato e stipitato (gambo), con imenio esterno nella mitra, a superficie liscia, costituito da uno strato di aschi cilindracei, a 2-8 spore; spore bianche o ocracee, ellittiche, ellissoidee, fusoides, o filiformi, continue o settate.

Genere XXIX. *Morchella* Dill.

<i>Morchella rotunda</i> Pers.	Pag. 116	Tavola	CIV
» <i>deliciosa</i> Fr.	» 117		CV
» <i>conica</i> Pers.	» 117		CVI
» <i>elata</i> Fr.	118		CVII

Genere XXX. *Mitrophora* Lev.

<i>Mitrophora hybrida</i> (Sow.) Bond.	Pag. 119	Tavola	CVIII
--	--------------------	--------	-------

Genere XXXI. *Gyromitra* Fr.

<i>Gyromitra esculenta</i> (Pers.) Fr.	Pag. 120	Tavola	CIX
--	--------------------	--------	-----

Ordine IV. — Tuberoidee Vitt.

Funghi carnosi, carnosio-tenaci o coriacei, sottoterranei o quasi sotterranei, a ricettacolo globoso o tuberoso, con imenio interno costituito da aschi di varia forma, 1-8 spori; spore continue, di varia forma e colore.


Famiglia IX. — Tuberacee Fr.

Funghi carnosi o carnosio-tenaci, con ricettacolo tuberoso, sotterraneo o raramente scoperto alla sommità, internamente a gleba solida, percorsa da venature bianche o cellulosa, con imenio formato da aschi globosi, ellittici, cilindracei, allungati, 1-8 spori; spore bianche o ocraceo-fosche, globose, ellittiche, ovate o navicolari, lisce, aculeate o reticolate.

Genere XXXII. *Tuber* Mich.

<i>Tuber melanosporum</i> Vitt.	Pag. 123	Tavola	CXII fig. 2.
---------------------------------	--------------------	--------	--------------





L'uso dei funghi come cibo data da antichissimo tempo. I Greci e i Romani, come rileviamo dalle opere di Ateneo, Ippocrate, Teofrasto, Dioscoride, Plauto, Orazio, Ovidio, Celso, Apicio, Plinio ecc. consideravano i funghi come un alimento salubre e squisito; se ne servivano a preferenza come condimento delle loro vivande; ed Apicio, il più celebre gastronomo dell'Impero romano, nella sua opera *De re culinaria* dava i principali precetti sul modo con cui dovevano essere preparati.

La cognizione però che si aveva di questi esseri curiosi era soltanto empirica, e perciò non si sapeva sempre distinguere fra le specie buone e le dannose, per cui succedevano frequenti casi di avvelenamento, e la storia ne registra anche di celebri. Ippocrate ci narra l'avvelenamento per funghi della figlia di Pausania, il celebre spartano vincitore di Platea, Tacito e Svetonio commemorano la morte dell'imperatore Tiberio Claudio, causata da una pietanza di funghi, e Se-

neca quella di Emeo Sereno prefetto delle guardie dell'imperatore Nerone.

Cotesti dolorosi accidenti, che si moltiplicarono anche nei secoli posteriori, richiamarono l'attenzione dei naturalisti, i quali, specialmente nei due ultimi secoli, si diedero con amore allo studio di questa classe di piante onde togliere tali inconvenienti. E difatto d'allora in poi furono pubblicate moltissime opere, specie nel nostro secolo, sui funghi mangerecci e venefici, ed ora si può dire che ogni nazione possiede dei lavori sotto questo aspetto abbastanza perfetti, che possono soddisfare a tutte le esigenze di chi desidera cibarsi di questo importante alimento vegetale.

Nella nostra favella però un'opera abbastanza generale e nel medesimo tempo breve e chiara, adattata alla intelligenza di ognuno, non la abbiamo: ¹⁾ anche quella del d.r Carlo Vittadini²⁾, che è certamente la migliore, è troppo speciale e scritta con soverchia prolissità da stancar pure chi voglia correre dietro ai più minuti dettagli. Laonde, avuto anche riguardo ai funghi che da noi crescono più copiosi che altrove per essere utilizzati, ho pensato bene di far cosa vantaggiosa col dare alla luce il presente lavoro, in cui vengono illustrate tutte le specie mangerecce che si possono raccogliere in abbondanza dovunque o in qualche località.

¹⁾ Durante la stampa del presente Trattato si pubblicò nei *Manuali Hoepli* un'opera con 13 tavole e incisioni del D.r Fr. CAVARA che è molto pregevole sì per il testo che per le illustrazioni.

²⁾ *Descrizione dei funghi mangerecci più comuni dell'Italia ecc.* Milano, 1835.

I disegni illustrativi sono tratti dal vero colla più possibile esattezza, e nella compilazione del testo si procurò di congiungere la brevità alla chiarezza, onde ciascuno, senza troppo dilungarsi, possa conoscere facilmente le singole specie quando ne farà la raccolta. Aggiungo pure l'illustrazione delle specie più pericolose e più frequenti dei funghi velenosi per togliere, col confronto, qualsiasi confusione ed assicurarsi così dal pericolo di avvelenamento. Per la intelligenza dei termini necessari alla descrizione premetto alcuni cenni generali sui funghi, indicando inoltre alcune norme per la raccolta e la cucinatura dei medesimi.

Rendo poi pubbliche grazie alla chiar. signora baronessa Giulia Turco-Lazzari che gentilmente mi favorì dalla sua bellissima collezione d'acquarelli i disegni di parecchie specie che io non aveva avuto l'opportunità di dipingere. Quali sieno è indicato a pie' di ogni tavola.

Trento, nel novembre 1894.

SAC. G. BRESADOLA.



PARTE GENERALE.

NATURA E FORMA DEI FUNGHI.

I funghi costituiscono la classe più estesa e più importante del regno vegetale. Quantunque lo studio dei medesimi sia convenientemente sviluppato soltanto negli ultimi decenni, dopochè il perfezionamento del microscopio permise di esaminare i fungilli più minuti, detti perciò microscopici, pure il prof. P. A. Saccardo potè già dare nella sua ponderosa opera *Sylloge fungorum omnium* la diagnosi di 39663 specie; ed è da ritenere che quando ne sarà esplorato l'intero campo supereranno le cento mila. Nell'economia della natura poi disimpegnano una parte oltre modo considerevole. Essi sono i principali agenti della fermentazione e della decomposizione dei corpi organici, riuscendo talora di suprema utilità e talora cagionando gravissimi danni, come all'agricoltura, dando origine alle malattie delle piante, e all'uomo producendo le più terribili ed insanabili infermità. — Essi riescono qualche vòlta di vantaggio alle arti, pel tessuto, pel colore ecc., e all'uomo per l'alimento sano, nutritivo, di buonissimo gusto e delicato che gli offrono. L'analisi chimica ha comprovato che, in vista della quantità considerevole di materie azotate che contengono, il loro valore nutritivo supera quello del pane, dei legumi, e si avvicina alla carne; e l'esperienza dimostrò che l'uomo potè nutrirsi convenientemente con soli funghi per mesi interi.

I funghi che servono di nutrimento sono i più grandi, conosciuti anche volgarmente col nome di funghi: di questi soltanto ci occuperemo. Essi appartengono per la maggior

parte al gruppo delle Imenomiceteae (Agaricaceae, Poliporaceae, Elvellaceae, Clavariaceae, più raramente alle Gasteromiceteae (Vescio), alle Discomiceteae (Spugnole) e alle Tubericeteae (Tartufi). — A qualunque di questi gruppi appartengano si possono considerare composti di due parti, cioè della parte vegetativa, che si nasconde sotto terra o nel corpo organico su cui il fungo vegeta, la quale si chiama *Micelio*, e della parte riproduttiva, che è visibile esteriormente, ad eccezione delle Tubericeteae, e che costituisce il fungo propriamente detto, che si chiama il *Ricettacolo*.

Del Micelio.

I nostri buoni antenati favoleggiarono anche sopra l'origine dei funghi, come di tutte le cose naturali; ma ora ognuno che abbia un po' di coltura sa che i funghi hanno origine dal seme che essi stessi poi riproducono. Questo seme piccolissimo, da non potersi vedere che al microscopio sotto forte ingrandimento, si chiama con termine tecnico *spora*. Essa cade dal fungo sulla terra o sopra i corpi che servono a nutrirlo, come radici e tronchi di alberi, steli di erbe ecc., ed ivi, quando le condizioni atmosferiche sono favorevoli, germina e produce il *micelio*, il quale a completo sviluppo si presenta o sotto forma di una reticolazione di filamenti bianchi e bambagiosi che involgono la terra, o sotto forma di una membrana bianca che si introduce tra la corteccia degli alberi, o anche sotto forma di un corpo solido, rotondo, della grandezza d'un grano o di un tubero, vegetante sotto terra o sui vegetali in decomposizione. Il micelio presso i funghi equivale alle radici presso le altre piante; esso produce il *ricettacolo* o fungo propriamente detto.

Del Ricettacolo.

Dicesi ricettacolo quella parte del fungo che contiene gli organi della riproduzione. Esso varia significativamente nella forma.

Nelle Agaricacee (vedi Tav. I, si genera dai filamenti del micelio sotto forma di gemma o sovente di uovo (Tav. I, fig. 1) e crescendo a perfetto sviluppo presenta le seguenti parti: capello, lamelle, gambo, anello e volva.

Il *cappello* è la parte superiore del fungo; ha forma orbicolare disposta ad ombrello (Tav. I, fig. 3, *a*) ed è munito inferiormente di fogliette o lamine che lo vestono a guisa di raggi, le quali si chiamano *lamelle* (Tav. I, fig. 3-4 *b*). Queste costituiscono il così detto *Imenio* o membrana contenente gli organi della riproduzione. Per poter osservare costesti organi conviene fare dei tagli finissimi attraverso alle lamelle e sottoporli all'osservazione microscopica. Allora si scorge che la superficie d'ambidue i lati delle lamelle è formata da cellule claviformi verticali all'asse longitudinale, che si chiamano *basidii* (Tav. I, fig. 5). Essi contengono un succo granuloso detto *protoplasma*, che uscendo alla sommità dei basidii maturi per i tubetti (*sterimmi*) che si formano in cima agli stessi genera le spore (Tav. I, fig. 6) in numero eguale agli sterimmi, cioè una per sterimma. Il cappello si appoggia ad un sostegno verticale, che lo congiunge col luogo dove nasce e che si chiama *gambo* (Tav. I, fig. 3, *c*). Alla sommità del gambo si trova l'*anello* (Tav. I, fig. 3-4, *d*), specie d'invoglio parziale per proteggere gli organi della riproduzione, e che quando il fungo è maturo riesce d'ornamento al gambo. Alla base del gambo poi si trova la *volva* (Tav. I, fig. 3-4 *e*) che è l'invoglio generale e che serve a difendere il fungo nel primo sviluppo. Crescendo poi il fungo rompe la volva, rimanendo essa in parte aderente al cappello sotto forma di verruche o brandelli (Tav. V, VI, VII ecc.) e in parte investendo la base del gambo in forma di sacco col margine lacerato o regolarmente disposto a lobi (Tav. I, fig. 3, *e*). — Nella maggior parte dei funghi però tanto l'anello che la volva sono assai tenui e spariscono affatto appena incominciano a svilupparsi le parti del ricettacolo, e perciò si dicono essere senza anello e senza volva.

Le **Poliporacee** e le **Iduacee** hanno il medesimo sviluppo e la medesima forma di ricettacolo delle Agaricacee, manca però quasi sempre la volva, e l'anello si trova soltanto in qualche specie. Differiscono però nell'imenio, che nelle Poliporacee è formato da tubetti saldati insieme, formanti alla estremità inferiore una superficie porosa (Tav. LXXXV, fig. c), e nelle Iduacee è costituito da aculei che coprono la parte inferiore del cappello (Tav. XCIX). Gli organi della riproduzione, cioè i basidii e le spore, si formano nella cavità dei tubi e alla superficie degli aculei.

Le **Clavariacee** hanno un ricettacolo affatto diverso (Tav. C-CII). Non vi è cappello, ma soltanto una specie di gambo che si chiama *tronco*, dal quale si sviluppano dei rami cilindrici o compressi che si biforcano una o più volte e danno al fungo l'aspetto d'un cespuglio in miniatura. Tutta la superficie dei rami è coperta dalla membrana imenifera, che porta gli organi della fruttificazione identici ai già indicati.

Le **Vescie** (Gasteromicetee) hanno il ricettacolo globoso o ovato, che si chiama *utero*, il quale è raramente fornito di gambo (Tav. CX-CXI). L'utero è esteriormente coperto da una o due membrane che si chiamano *peridio*, il quale racchiude una sostanza bianca, compatta, detta la *gleba*, che nel fungo maturo diventa gialla o verdastra e si riduce in polvere. Gli organi della riproduzione, eguali a quelli delle Imenomicetee, stanno nella gleba, e la polvere interna è tutta formata dalle spore mature.

Le **Spugnole** (Discomicetee) hanno pure un ricettacolo speciale che si chiama *mitra*, costituito da una specie di cappello ovato o piramidale tutto coperto da fossette o alveoli, nei quali si trovano gli organi della riproduzione (Tav. CIV-CVIII). In questa classe di funghi le spore non si generano all'apice, ma nell'interno delle cellule claviformi, le quali sono generalmente più allungate che presso le Imenomicetee e si distinguono col nome di *teche* o *aschi*. In ogni tecca si trovano generalmente otto spore (Tav. CVI, fig. e).

Quando la spora è matura esce dalle teche che si aprono alla sommità per uno opercolo.

I **Tartufi** (Tuberacee) hanno il ricettacolo della forma d'un *tubero* (Tav. CXII), che nasce e si sviluppa sotto terra. La sostanza interna è carnosa, costituita da una polpa compatta percorsa da venature di diverso colore. La superficie è composta da una pellicola per lo più bitorzolata o anche liscia, che racchiude la polpa. Gli organi della riproduzione stanno nell'interno, e sono simili a quelli delle Spugnole, cioè le spore si generano nelle teche (Tav. CXII, fig. II c).

Norme per la raccolta, preparazione e conservazione dei funghi.

I mezzi empirici che si usano generalmente per distinguere i funghi buoni dai cattivi non valgono a nulla, come p. es. il prezzemolo, il cucchiaino d'argento ecc., o non sono sempre sicuri. Così il sapore amaro, piperato, acre, il cambiamento di colore della carne del fungo al taglio, per giudicare il fungo velenoso; o viceversa il sapore dolce, l'odore grato di farina fresca o di frutta, il colore bianco, immutabile, per ritenere il fungo mangereccio. Sonvi dei funghi velenosi che hanno buon odore e sapore, a cagion d'esempio il *Moscario*, e funghi mangerecci con sapore acre e piperato, come il *Lapaccendro* (fungo del Pin, del sangue) ecc. Conviene dunque conoscere bene le specie basati sui caratteri che vengono esposti per ogni fungo, e scegliere soltanto quegli individui, sui quali non si ha alcun dubbio, dietro le seguenti precauzioni:

1. I funghi si devono raccogliere sempre a tempo asciutto e dopo scomparsa la rugiada, specialmente se si vogliono disseccare e conservare per l'inverno. A tempo umido o subito dopo la pioggia sono viscosi, acquosi, insipidi, meno nutrienti, e perciò meno digeribili. Non sono da raccogliere che individui giovani o non ancora intieramente sviluppati. Quando il fungo è vecchio diventa sempre pericoloso pel

motivo che la carne si fa molle ed incomincia a putrefarsi, ed allora si sviluppano i veleni che si riscontrano nelle sostanze in decomposizione e che si conoscono sotto il nome di formazioni tanniniche. Anche gli individui corrosi dagli insetti sono da rigettare. Non si devono strappare dalla terra, ma tagliare il gambo alla base, altrimenti la terra penètra nelle lamelle o nei pori ecc., ed è sempre difficile purgarli completamente.

2. Nella preparazione ad uso di cucina alle qualità viscose o squamose si devono levare la pelle e le squame del cappello; se hanno le lamelle o i tubi troppo sviluppati si tagliano via; inoltre a quelli che hanno il gambo tenace esso deve togliersi, come pure l'anello e la volva. Tutte queste parti, benchè innocue, siccome sono membranacee, diminuiscono il gusto dei funghi e li rendono meno digeribili. In regola generale si deve ritenere soltanto la parte carnosa del fungo per uso culinario.

3. Per la conservazione i funghi preparati come al n. 2 si tagliano a pezzetti, si distendono sopra delle assi o dei graticci, e si espongono in luogo asciutto all'aria fino a che sono perfettamente disseccati, indi si pongono in sacchetti ermeticamente chiusi e si appendono in luoghi asciutti ed arieggiati. In questa maniera si conservano anche per un anno. Avanti di cuocerli devono essere posti per alcune ore nell'acqua tiepida.

Se i funghi vengono usati come semplice condimento allora appena disseccati si pestano in un mortaio e si riducono in polvere. Si pone la polvere in vasi ben otturati e si usa specialmente a profumare le salse. Anche i cibi trattati con questa polvere prendono un gusto speciale e molto delicato.

Cucinatura dei funghi.

Molti funghi si possono mangiare anche crudi, come sarebbe il Prataiuolo, la Mazza di Tamburo, le Di-

tole (Ciatte d'orso), il Porcino (Brisa), il Poliporo ovino, il Poliporo confluyente ecc. I boscaioli della Selva nera, a stagione favorevole, si cibano quasi esclusivamente di funghi crudi, che mangiano col pane e raramente condiscono con un po' d'olio e di pepe.

La maggior parte però dei funghi devono essere cotti per potersene cibare. In generale non si devono lasciar cuocere lungamente. Per le specie più tenere, come l'Uovo, l'Amanita vaginata, l'Amanita solitaria, il Prugnolo ecc. è più che sufficiente una mezz'ora; per le specie che si preparano disfritte, come le Vesce, l'Amanita vaginata ecc. bastano dieci minuti o un quarto d'ora; per le specie poi più tenaci occorre un'ora circa.

Diverse sono le maniere di cucinare i funghi; ne accennerò solamente qualcheduna delle più pratiche ed economiche, rimandando per più estese notizie ai libri di cucina.


1. La più semplice e comune maniera si è di prepararli ad uso intingolo. Tagliati i funghi a pezzetti e ben lavati si pongono nella casseruola a freddo con metà olio d'ulivo e metà burro, prezzemolo, aglio o cipolla, pepe e sale, e si lasciano bollire finchè sia svaporata l'acqua che essi formano e rimanga il solo condimento, indi se non sono ancora cotti vi si aggiunge di frequente un po' d'acqua calda o meglio del brodo di carne, però poco alla volta in modo che i funghi rimangano sempre nel condimento; a cottura perfetta si unisce del formaggio grattugiato e si servono.

2. Alla graticola. Si prende il cappello del fungo senza gambo, si dispone sulla graticola in modo che la parte concava rimanga rivolta all'in su, e vi si pone sopra un ripieno col gambo finamente triturato, prezzemolo, sale, pepe e olio. In breve tempo sono cotti. Col medesimo trattamento si possono cuocere, invece che sulla graticola, in uno stampo da torta.

3. A uso frittura. Si prende il cappello dei funghi più teneri, se è sottile, intero, se molto carnoso tagliato a fette; le vescie si tagliano pure a fette trasversali, indi si tingono i pezzi nell'uovo sbattuto, si ripiegano nella farina di frumento e si friggono. Bastano 10-15 minuti per la cottura. Devono essere serviti caldi, onde riescano gustosi.

4. Al pasticcio di maccheroni. Si preparano i funghi e si cuociono come al n.º 1, poi si uniscono ai maccheroni, si involgono nella sfogliata e si pongono nello stampo come si usa col solito pasticcio di maccheroni.

5. A uso bodino o torta. I funghi si tagliano fini, si fa loro perdere l'acqua naturale in una casseruola, indi si mescolano, proporzionatamente alla grandezza dello stampo, con pane bagnato nel latte, uova, sale, burro o lardo, e la pasta così formata si pone nello stampo di bodino o torta spalmato col burro.



PARTE SPECIALE.

Descrizione delle specie.



I. IMENOMICETEE.

Famiglia delle Agaricacee.

Genere Amanita.

Funghi carnosì, nel primo sviluppo involti in un sacco membranaceo o squamoso-farinoso, detto *volva*, che nel fungo completo si squarcia e resta aderente alla base del gambo sotto forme di calza, per lo più all'apice libera e lobata; gambo quasi sempre con anello il cui tessuto è separato da quello del cappello, per cui facilmente si possono staccare uno dall'altro; lamelle libere o attenuato-appressate al gambo; spore *bianche* (jaline), lisce, globose, globoso-ellittiche o allungate.

AMANITA CAESAREA Scop. Tavola I.

Nome italiano: Uovolo, Uovolo buono. Nome volgare: Bragaldo rosso (Storo), Bolèt, Fungo ovo, Coo bon (Italia). Nome francese: Oronge vrai. Nome tedesco: Kaiserling.

Nel primo sviluppo è incliuso in una volva bianca e presenta l'aspetto di un uovo. Indi la volva si apre e il fungo s'innalza presentando un cappello convesso che poi si spiana, col margine striato, tinto d'un bel ranciato o rosso-ranciato; le lamelle sono spesse, color giallo-uovo, libere al gambo, cioè non aderenti allo stesso; il gambo è pieno internamente sul principio, poi diventa vuoto, tubuloso, color giallo come le lamelle, all'apice porta l'anello del

medesimo colore, striato esternamente; alla base del gambo si trova la volva di color bianco, col bordo lobato; la carne è bianca, con striscie gialle sotto l'epidermide, di odore e sapore gradevole; la spora è di forma ovale, di color bianco-vitreo, della dimensione di 10-12 \times 6-7 μ , cioè lunga da 10 a 12 millesimi di millimetro e larga da 6 a 7; i basidii sono clavati, 40-45 \times 8-10 μ , cioè lunghi 40 a 45 e larghi 8 a 10 millesimi di millimetro¹⁾.

Cresce nei boschi della zona della vite, Trento a Gocciadoro, Rovereto, Giudicarie, Val di Non, Verla, ecc.

È una delle specie *più squisite*. Era già nota ed apprezzata dai Greci e dai Romani. Si può facilmente distinguere da ogni altro; l'unica specie colla quale può confondersi sarebbe il Moscario quando ha perduto le verruche del cappello; però, anche in questo stato, è subito distinto se si osserva che quest'ultimo ha sempre le lamelle e il gambo bianchi, mentre l'Uovo lo ha sempre gialli.

Spiegazione delle figure: 1. Fungo giovane ancora inchiuso nella volva. 2. Il medesimo sezionato, dove si scorgono i rudimenti del cappello, delle lamelle e del gambo. 3. Fungo sviluppato. 4. Il medesimo sezionato per vedere la disposizione delle lamelle, la cavità del gambo ecc. 5. I basidii ingranditi 750 volte. 6. Le spore allo stesso ingrandimento.

AMANITA OVOIDEA Bull. Tav. II.

Nome italiano: Farinaccio. Nome Volgare: Farinon. Coch bianch, Oeuf bianch. Nome franc. Oronge blanche.

Si sviluppa come l'Uovo. Ha cappello da emisferico spianato, bianco, con leggiera tinta nocciola o pagliarina, liscio

¹⁾ Giudicai opportuno di dare, per chi può far uso del microscopio, anche la dimensione degli organi della riproduzione, affinchè abbia sott'occhio tutti i dati specifici del fungo.


L'unità di misura è il millesimo di millimetro, e l'ingrandimento delle spore e dei basidii nelle tavole è di 750 diametri.



Amanita ovoidea Bull. Farinaccio

vescuvia des.

1818



Amanita phalloides Fr. var. *viridis* (Bubhola verdognola,

{VULGUSO})

Spors. nat. ital.

Det. G. Spegel, Trento

come pelle di guanto, col margine nel fungo giovane farinoso-frangiato; lamelle molto spesse, ventricose, cioè più larghe nel mezzo, libere dal gambo, bianche; gambo solido (pieno internamente), alla base radicato nella terra, tutto coperto da fiocchi farinosi che scompaiono nel fungo adulto; anello bianco, tomentoso-farinoso, fragile, che sparisce nel completo sviluppo; volva persistente, tenace, bianca, poi giallastra; carne bianca, di grato sapore ed odore; spora ovata, bianca, 9-10 - 6-7 μ .; basidi clavati, 35-40 - 8-10 μ .

Nasce nelle boscaglie di collina sotto le querce e i castagni. Io non l'ho ancora trovato nel Trentino; ma mi fu detto che si trova nel tenere di Arco e di Ala, dov'è conosciuto sotto il nome di Bragaldo, nome del resto che nel Trentino vien dato a qualunque sorta di fungo.

È specie *mangerecchia* molto buona, ma meno pregiata dell'Uovolo.

Spiegazione delle figure: *a* Fungo giovane inchiuso nella volva. *b* Fungo sviluppato. *c* Sezione verticale del medesimo *d* Basidi. *e* Spore.

AMANITA PHALLOIDES Fr. — Tav. III.

Ital. Tignosa verdognola. Franc. Oronge verte. Ted. Gründlicher Knollenblätterschwamm.

Ha cappello da prima obovato, indi campanulato, poi spianato, a tempo umido un po' viscido, a tempo secco sericeo-lucente, di color bianco-citrino o verdognolo o anche grigio-olivastro; lamelle spesse, bianche, verso il gambo rotondate ed appressate allo stesso; gambo internamente da prima pieno, poi con cavità, attenuato verso la sommità, coperto da piccoli fiocchi che presto cadono rimanendo liscio, di colore biancastro; anello membranaceo, bianco-giallognolo, esternamente striato; volva membranacea, bianca, persistente, a margine lobato; carne bianca, nel fungo giovane senza odore, ma nel fungo adulto d'un odore forte, nauseante,

quasi cadaverico; basidi clavati, 35-40 \times 7-10 μ .; spore ovato-sferiche, bianche, 8-9 \times 7-8 μ .

Nasce nei boschetti a foglia di collina in estate e autunno, dovunque.

È uno dei funghi *più velenosi*; anzi si giudica il più pericoloso di tutti; nè si conosce finora rimedio efficace contro la natura particolare del veleno che contiene, il quale è conosciuto sotto il nome di *Fallina*. Anche nel fungo disseccato ne sarebbe contenuto l'1 $\frac{1}{6}$ %. Fu sperimentato sopra cani e gatti che questo veleno produce la morte facendone delle iniezioni sottocutanee a ragione di mezzo milligramma per chilogramma d'animale. È quindi della massima importanza di ben conoscerlo, onde evitare le conseguenze funeste che derivano dal cibarsene. La maggior parte dei casi di avvelenamento seguiti da morte, dei quali si ha potuto constatare la causa, provenivano da questa Amanita.


Spiegazione delle figure: *a-b*. Fungo in vario grado di sviluppo. *c* Sezione verticale. *d* Basidi. *e* Spore.

AMANITA VERNA Bull. — Tav. IV.

Ital. Tignosa di primavera. Franc. Oronge printanière. Ted. Weisser Knollenblätterschwamm.

Ha cappello da prima convesso, poi spianato e depresso nel mezzo, liscio, a tempo umido un po' viscoso, di color bianco candido con leggiera tinta paglia nel centro; lamelle spesse, bianche, libere al piede; gambo pure bianco, tutto coperto da fiocchetti cruscosi, che svaniscono al tatto o colla età, internamente cavo e nel vuoto qua e là otturato da fiocchi bambagiosi; anello pure bianco, apicale, membranaceo; volva libera alla sommità e lobata; carne bianca, molle, nel fungo giovane di nessun odore, poi nauseante e di sapore da prima dolceigno, indi acre; basidi clavati, 40-45 \times 10-12 μ .; spore globose, bianche, 7-10 μ . di diametro.

Nasce nei boschetti di collina, dovunque, ma raro.



Amanita verna Bull. (= *Bubba primaverile*)

(VALLINUS)

Bressola vis.

1885. 10. 10.

È *venefico*, anzi una delle specie più pericolose. Anche essa può confondersi colla varietà bianca dell'*Amanita vaginata*, la quale però si distingue subito per la mancanza di anello.

Spiegazione delle figure: *a-b* Fungo in vario grado di sviluppo. *c* Sezione verticale. *d* Basidii. *e* Spore.

AMANITA MAPPA Batsch. — Tav. V.

Ital. Tignosa pagliata. Franc. Oronge citrine. Ted. Citronengelber Knollenblätterschwamm.

Ha cappello da prima obovato, poi spianato e depresso nel mezzo, di color limone pallido, per lo più coperto dei rimansugli della volva sotto forma di verruche piramidali, fiocose, talora appuntite, di color giallo-rossastro; lamelle spesse, di color bianco, verso il gambo rotondato-appressate allo stesso; gambo tutto coperto da una pruina eruscosa che svanisce coll'età, bianco o con leggiera tinta citrina, terminante alla base in un tubero rotondo, spianato alla sommità e nel contorno screpolato longitudinalmente, di colore giallo-rossastro; anello grande, color giallo-canarino, sopra liscio, sotto tomentoso-bambagioso, col bordo frangiato; carne bianca, molle, nel fungo sviluppato di odore viroso nauseante; basidii clavato-capitati, 30-35 \times 10 μ ; spore globose, bianche, 8-9 μ . di diametro.

Nasce nelle selve di montagna, specialmente nei luoghi abbondanti di terra vegetale, e sulle ceppaglie intieramente marcite e ridotte quasi a *humus*.

È *venefico*, però molto meno pericoloso dell'*Amanita phalloides* e dell'*Amanita verna*, e gli avvelenamenti con questo fungo non ebbero mai esito letale se si usarono i debiti rimedii.

Spiegazione delle figure: *a* Fungo intieramente sviluppato. *b* Sezione verticale. *c* Basidii. *d* Spore.

AMANITA MUSCARIA Linn. — Tav. VI.

Ital. Tignosa dorata, Moscario, Uovolo malefico rosso.
 Franc. Fausse Orange. Ted. Fliegenschwamm.


Ha cappello da prima ovato, poi piano-convesso, leggermente viscoso, di colore rosso-ranciato, rosso-cinabro o scarlatta, tutto coperto da verruche di varia forma, bianche o con tinta citrino-palida; lamelle spesse, bianche, verso il gambo attenuate, attingenti lo stesso ad uncino; gambo bianco, coperto di piccolissimi fiocchi che poi svaniscono, pieno, diventante vuoto coll'età, alla base ovato-bulboso, con varie serie di squame circolari; anello bianco, bambagioso, liscio, dal lato interno bordato da un tomento giallo; carne bianca, sotto l'epidermide del cappello color giallo-uovo, di nessun odore o sapore speciale; basidii clavati, 40-50 10-12 μ .; cistidii fusoidi; spore ovato-sferiche, 10-12 8-9 μ .

Nasce copiosissimo in autunno, specialmente nelle selve di conifere, in tutto il Trentino. Contiene un alcaloide conosciuto col nome di *Moscarina* che presenta delle proprietà *venefiche*. Se si macera il fungo un po' nell'acqua saturata di sale e commista coll'aceto, il veleno si discioglie, e si può, gettando l'acqua, mangiare il fungo senza pericolo. In questa guisa viene consumato dai contadini russi, i quali preparano anche collo stesso una bevanda inebriante, assai in uso colà. Onde evitare disgrazie, nel caso non venisse ben preparato, è meglio astenersi affatto dal mangiare questo fungo che del resto è subito riconoscibile, nè è facile scambiare con altri. Le forme a cappello rosso-ranciato, quando sono sviluppate e hanno perduto le verruche del cappello, potrebbero confondersi coll'Uovolo (Tav. I), ma se si osservano le lamelle e il gambo l'errore non può aver luogo, giacchè nel Moscario sono sempre bianchi, mentre nell'Uovolo sono gialle.

Spiegazione delle figure: *a* Fungo nel primissimo sviluppo ancora involto nella volva. *b* Fungo sviluppato. *c* Sezione verticale. *d* Basidii. *e* Cistidio. *f* Spore.




Agaricus muscarius L.



Amanita muscaria Linn. Moscarion

— *muscaria* (L.) Berk. (1805) — *muscaria* (L.) Berk. (1805)




Amanita pantherina DeC. (*Figura nigra rigata*)

Fresarola aia.

[VELENOSO]

Milano del Trento



Amanita solitaria Bull. (Tignosa bianca)

Breslau, 1815.

(Lign. nat.)

Lit. a Zappal' Pina.

AMANITA PANTHERINA De C. — Tav. VIII.

Ital. Tignosa bigia, rigata. Franc. Oronge panthère.
 Ted. Pantherschwamm.

Ha cappello da prima emisferico, poi spianato-depresso, leggermente viscoso, col margine striato, color castagno-fuliginoso o terra d'ombra, tutto coperto da piccole verruche bianche, fiocose; lamelle spesse, bianche, libere al gambo; gambo bianco, fibrilloso, da prima pieno, poi cavo, terminante alla base in un bulbo ovato, limitato superiormente da un orlo ottuso formato dalla volva; anello per lo più sotto la metà del gambo, talora doppio, bianco-cotonoso, nel fungo intieramente sviluppato quasi sempre scomparso; carne bianca, di odore nauseante, viroso nel fungo adulto; basidii clavati, 32-40 \approx 12 μ ; spore obovate, bianche, 10-12 - 7-8 μ .

Nasce nei boschetti a foglia di collina abbastanza frequente.

È *velenoso*; contiene esso pure la *Moscarina*, e i sintomi che presenta l'avvelenamento con questo fungo sono quasi identici a quelli che si osservano nell'avvelenamento prodotto dal morso della vipera, per il che si usò sovente con successo anche contro questo avvelenamento l'ammoniaca, a cui però si faceva precedere una dose di emetico, onde far evacuare le parti del fungo non ancora digerite.

Spiegazione delle figure: *a-b* Fungo in due varii gradi di sviluppo. *c* Sezione verticale. *d* Basidii. *e* Spore.

AMANITA SOLITARIA Bull. (*Am. strobiliformis*. Vitt.)

Tav. VIII. $\frac{1}{2}$ grandezza naturale.

Ital. Tignosa bianca maggiore dei campi con radice grossa. Franc. Oronge solitaire.

Ha cappello da convesso spianato e finalmente depresso nel centro, di colore bianco, con tinta bianco-sporea o grigiastria nel mezzo, tutto coperto da verruche piramidali

troncate, di color cinereo, col margine elegantemente frangiato da fiocchi candidi, farinosi, che spariscono nel fungo adulto; lamelle assai spesse, candide, appressate al gambo e poi libere dallo stesso; gambo solido, bianco, coperto sul principio da squame bianche, fioccoso-farinose, che scompaiono al tatto e nel fungo perfettamente sviluppato, terminante alla base in un bulbo ovato o coniforme, talora di grande dimensione, superiormente per lo più spianato e quasi tutto confitto nel terreno: anello apicale, bianco, ampio, riflesso, membranaceo-fioccoso, esternamente striato, che cade sempre a pieno sviluppo; carne bianca, senza odore speciale e di grato sapore; basidii clavati, 40-50 \times 9-10 μ .; spore ellittiche, bianche, 11-12 \times 7-8 μ .


Nasce al margine dei prati dove sono costeggiati da alberi, nei boschetti di collina, nei luoghi un po' umidi. Da noi è raro; trovasi nei dintorni di Trento a Gocciadoro, S. Rocco, ecc.

È *mangericcio* e assai gustoso. Si cuoce in una mezz'ora; e se si prepara fritto con olio, sale, pepe e prezzemolo, conservando il cappello intero, oppure se si frigge involto con farina ed uovo, è sufficiente una cottura di un quarto d'ora.


AMANITA RUBESCENS Fr. Tav. IX.

Ital. Tignosa vinata. Franc. Orange vineuse. Ted. Perlenschwamm.

Ha il cappello da convesso piano-depresso, di colore grigio-rossastro, giallo incarnato o vinato sporco, con macchie più sature, tutto coperto da verruche della medesima tinta; lamelle bianche, spesse, attenuate verso il gambo e decorrenti sullo stesso sotto forma di filetti o strie; gambo solido, raramente vuoto in età, bianco, poi prendente una leggiera tinta vinata, che termina alla base in un bulbo ovato con solchi circolari e screpolature longitudinali; anello apicale, ampio, bianco con bordo fioccoso, rosseggiante, esternamente



Amanita rubescens Pers. (*Tignosa vinata*)



Amanita spissa Fr. (*Tigrosa scroziata*)
(VELENOVO)

Illustrata a:

Lu. di Zappal' Tremis

striato; carne bianca nel fungo giovane, rosso-vinata al taglio e nel fungo adulto, di odore appena sensibile e di sapore dolceigno; basidii clavati, 30-40 - 8-10 μ .; spore ovato-sferiche, bianche, 8-9 - 6-7 μ .

Nasce specialmente nei boschi a foglia di collina, più raro nelle selve di conifere, in tutto il Trentino.

È *mangereccio*, di buon gusto, e si prepara come l'*Amanita solitaria*. Si può facilmente confondere coll'*Amanita aspera* (Tav. XI), la quale è velenosa, e perciò si deve bene attendere quando si raccoglie. L'*Amanita aspera* non ha mai tinta rossastra e la carne della medesima è sempre bianca.

Spiegazione delle figure: *a* Fungo nel primo sviluppo quasi intieramente involto nella volva. *b* Fungo sviluppato. *c* Sezione verticale. *d* Basidii. *e* Spore.

AMANITA SPISSA Fr. - Tav. X.

Ital. Tignosa screziata. Franc. Oronge perlée.

Ha cappello da prima emisferico, poi spianato-depresso, di colore grigio-fuliginoso o castagno-fuliginoso, tutto coperto da verruche irregolari, bianco-grigiastre; lamelle bianche, spesse, aderenti al gambo e decorrenti a filetto sullo stesso; gambo pieno, in età un po' cavo, bianco, sotto la metà coperto da squame bianche e con tinta quadrello, alla base radicato; anello apicale, bianco, esternamente striato, che scompare nel fungo adulto; carne bianca, molle, di nessun odore o sapore speciale; basidii clavati, 35-40 - 8-10; spore bianche, ovato-sferiche, 10 - 8 μ .

Nasce nelle selve di conifere piuttosto raro. Val di Sole, Campiglio, ecc.

È *velenoso*, ma poco conosciuto essendo per lo più confuso coll'*Amanita pantherina*, alla quale somiglia molto.

Spiegazione delle figure: *a-b* Fungo osservato in due diverse posizioni. *c* Sezione verticale. *d* Basidii. *e* Spore.

AMANITA ASPERA Fr. Tav. XI.

Ital. Tignosa aspra. Franc. Oronge âpre. Ted. Schuppiger Fliegenchwamm.

Ha cappello da convesso spianato, a tempo umido viscosetto, di colore fosco-grigiastro, con tinta qua e là giallastra, tutto coperto da verruche bianco-giallognole, appuntite al centro e nel resto appianate; lamelle bianche, spesse, verso il gambo attenuato-aderenti; gambo pieno, poi cavo, tutto coperto da piccoli fiocchi o squamette che svaniscono nel fungo adulto, alla base terminante in un bulbo obovato, coperto dai brandelli della volva; anello apicale, bianco, esternamente striato, e bordato internamente da una frangia di fiocchi gialli; carne bianca, sotto l'epidermide del cappello giallognola, di sapore dolciastro e odore nel fungo vecchio nauseoso, basidii clavati, 45-50 8-10 μ .; spore ovato-sferiche, 8-10 6-7 μ .

Nasce nei boschi a foglia di collina; specialmente nei castagneti, ma raro.

È *velenoso*; anzi è una delle specie più deleterie. Si può confondere, osservandolo superficialmente, coll' *Amanita rubescens* (Tav. IX); ma questa, come abbiamo osservato, è chiaramente distinta pel colore vinato di tutte le sue parti, specie della carne.

Spiegazione delle figure: *a-b* Fungo in due gradi di sviluppo. *c* Sezione verticale. *d* Basidii. *e* Spore.


AMANITA VAGINATA Bull. Tav. XII.

Ital. Bubbolina rigata senza anello, Falso farinaccio. Volg. Colombina. Franc. Grisette, Coucoumelle grise, Coucoumelle orangée. Ted. Brauner Wulstblätterschwamm.


Ha cappello da obovato spianato-depresso, talora con leggiera protuberanza (umbone) nel centro, col margine striato, poi solcato-pettinato, di color variabile, bianco, piombino, ce-



Amanita sphaeroides Pers. *fly agaric* (L.)
 (A. sphaeroides) (L.) V. & S.



Amanita vaginata Bull. (*Bubholina rigata* senza anello)



Lepiota procera Scop. (Mazza da tamburo)

($\frac{1}{2}$ gr. nat.)

Bresalola dis.

Bot. Zippel Trento

nera o fulvo-ranciato; lamelle spesse, bianche, libere al gambo; gambo bianco, senza anello, coperto da piccoli fiocchi che svaniscono a perfetto sviluppo, pieno, poi vuoto, attenuato alla sommità e involupato alla base in una volva grande, bianca, membranacea, lobata; carne bianca, di sapore grato e odore non speciale; basidii clavati, 40-50 10-12 μ .; spore sferiche, 10-12 μ . di diam.

Nasce dovunque nelle selve dalla primavera a tardo autunno, generalmente sotto due forme. La prima di colore piombino (*Agaricus plumbeus* Schaeff.) e l'altra di color fulvo-ranciato (*Ag. fulvus* Schaeff.). È *mangereccio* e si presta ai medesimi usi dell'*Amanita solitaria* e *A. rubescens*. Convieni però osservare bene di non confonderla coll'*Amanita pantherina*, dalla quale si distingue subito per la mancanza dell'anello, e per la volva membranacea persistente. Quando si raccolgono perciò degli individui dubbii devesi sempre osservare se alla base del piede hanno la volva, che sovente è coperta dalla terra.

Spiegazione delle tavole: *a-b* Due individui nel primo sviluppo della varietà *fulva*. *c* Individuo completamente sviluppato della varietà *plumbea*. *d* Individuo verticalmente sezionato. *e* Basidii. *f* Spore.

Genere Lepiota.

Funghi carnosì con cappello e gambo; gambo fornito d'anello, ma senza volva; tessuto del gambo separato da quello del cappello e perciò facilmente staccabili uno dall'altro; lamelle libere; spore *bianche*, lisce, di varia forma, per lo più ellittiche od obovate.

LEPIOTA PROCERA Scop. Tav. XIII.

Ital. Bubbola maggiore, Mazza da tamburo, Pellicione, Parasole, Tobbia. Franc. Couleuvrêlle. Ted. Parasolschwamm.

Ha cappello da prima ovale, indi campanulato, finalmente disteso col disco rialzato in una protuberanza (um bone) di colore grigio-rossastro o marrone, con epidermide dura, che si scerpula tutta in squame di varia forma sopra un fondo bianco-sporco, fibroso, con margine elegantemente frangiato, largo fino a 20 centimetri; lamelle spesse, larghe bianche, al gambo libere e congiunte ad anello; gambo cilindraceo, alto fino a 24 *cm*, tutto tigrato da squame brune, alla base bulboso, internamente cavo; anello mobile, composto di due o tre zone circolari. frangiato-lacere, al di sotto cartilagineo e bruno, sopra bianco e fioccoso-tomentoso; carne bianca, molle, in età tenace, di buon gusto e odore marcato, fungino; basidii clavati, 39-40 10-12 μ ; spore ellittiche od obovate, 12-15 \approx 8-10 μ .

Nasce nei luoghi campestri, al margine dei boschi sassosi, dovunque. È *di buon gusto* quando è giovane; si deve però levare il gambo, il quale è coriaceo e nettare il cappello dalle squame. Il fungo adulto diventa tenace e non si presta agli usi culinari.

Spiegazione delle figure: *a* Fungo a quasi completo sviluppo. *b* Fungo sezionato. *c* Basidii. *d* Spore.

LEPIOTA EXCORIATA Schaeff. Tav. XIV.

Ital. Bubbola buona. Volg. Tobbietta, Fungo della rugiada. Frane. Coulemelle chauve. Ted. Geschundener Blätterschwamm.


Ha cappello da prima obovato, poi conico-campanulato, finalmente spianato e rialzato nel mezzo con protuberanza a foggia di capezzolo (cappello umbonato), di color nocciola-pallido o biancastro, colla epidermide granulosa, presto lacerata in squamette e verso il margine ritirata, per cui apparisce come escoriato; lamelle spesse, bianche, al gambo libere e congiunte ad anello; gambo bianco, pruinato, poi liscio (glabro), internamente cavo (fistoloso), alla base ter-



Lepiota excoriata Schaeff. (*Bubibola buona*)

Bresadola dis.

Lit. G. Tappei Trento



Lepiota naucina Fr. (Tabbietta bianca)

minante in un piccolo bulbo spianato alla sommità; anello libero, membranaceo, che sparisce in età; carne bianca, di buon sapore; basidii clavati, 30-35 10-12 μ .; spore ovato-oblunghe, 15-17 9 μ .

Nasce nei luoghi erbosi al margine dei boschi, nei prati sterili vicini alle selve, nei luoghi incolti, al margine dei campi ecc. dall'agosto all'ottobre.

È *mangereccio* e di buonissimo gusto quando è giovine; invecchiando la carne diventa tenace, perde l'aroma e riesce indigesta.

Spiegazione delle figure: *a-b* Fungo in due diversi gradi di sviluppo. *c* Fungo sezionato. *d* Basidii con un cistidio. *e* Spore.

LEPIOTA NAUCINA Fr. (*Ag. leucothites* Vitt. *Ag. lacris* Krombh. *Ag. Schulzeri* Kalchbr.) - Tav. XV.

Ital. Tobbietta bianca. Franc. Bisette. Ted. Nakter Blätterschwamm.

Ha cappello della medesima forma della *Lepiota excoriata* e del medesimo colore o un po' più bianco, ma con epidermide liscia come pelle di guanto, diventante però un po' granulosa e con piccolissime squame al margine del cappello nel fungo adulto; lamelle spesse, al gambo libere e unite a circolo o anello, da prima bianche, indi quasi sempre con tinta color rosa o carnicina più o meno marcata; gambo bianco, un po' fibrilloso, internamente pieno d'un midollo bambagioso, poi cavo, alla base un po' ingrossato; anello bianco, membranaceo, internamente fioccoso; carne bianca, di buon sapore; basidii clavati, 35-40 10 μ .; spore obovate, bianche, con nucleo oleoso, color paglia, 8-9 6 μ .

Nasce nei medesimi luoghi della *Lepiota excoriata*, colla quale è facile confonderla quando è giovane.

È *mangereccio* e più delicata dell'*escoriato*. Non si può confondere con specie velenose.

Spiegazione delle figure: *a* Fungo sviluppato. *b* Fungo sezionato. *c*. Basidii. *d* Spore.

Genere *Armillaria*.

Funghi carnosì con cappello e gambo fornito di anello membranaceo o squami-forme, ma senza volva; tessuto del gambo omogeneo con quello del cappello, per cui non si possono staccare che rompendoli; lamelle variamente inserite al gambo, non libere; spore *bianche*, lisce, globose, obovate o ellittiche.

ARMILLARIA ROBUSTA Alb. et Schw. (*Ag. caussetta* Barla) —
Tav. XVI.

Ital. Agarico robusto. Franc. Le robuste Ted. Starker Blätterschwamm.

Ha cappello da convesso spianato e depresso, di colore rosso-mattone vivo o fulvo-ranciato o castagno-fulvo, con epidermide fibrosa, screpolata longitudinalmente al margine ed in piccolissime squame al centro; lamelle spesse, bianche, poi macchiate, del colore del cappello, verso il gambo rotondato-libere o sinuato-appressate; gambo solido, sopra l'anello bianco, coperto di piccoli fiocchi, sotto l'anello del medesimo colore del cappello, con fibrille longitudinali o piccole squame che scompaiono nel fungo vecchio; carne bianca, al taglio diventante color aurora, di odore leggero, non tanto grato e di sapore doleigno; basidii clavati, 25-35 4-5 μ .; spore bianche, ovato-oblunghe, con goccia oleosa, 5-6 3 μ .

Nasce nei pineti della zona della vite solitario o a cespi. Si può mangiare con piena sicurezza; però non è tanto gradevole per la carne un po' tenace ed amarognola. Sulla costa mediterranea (Genova-Nizza) è molto più frequente ed è consumato in grande quantità dalla gente di campagna, che lo conosce sotto il nome di *Caussetta*. Si deve badare di non confonderlo coll'*Armillaria aurantia* (Tav. XVIII),



Armillaria robusta Alb. & Schw. (Agarico robusto)



Armillaria caligata Viv. (Agarico calzato)

specie sospetta e frequente anche nelle selve di montagna, dove manca od è molto rara l'*Armillaria robusta*.

Spiegazione delle figure: *a* Cespito di individui completamente sviluppati. *b* Individuo sezionato. *c* Basidii. *d* Spore.

ARMILLARIA CALIGATA Viv. — Tav. XVII.

Ital. Agarico calzato. Volg. Calzetta, Caussetta (Litorale mediterraneo). Franc. La Caussetta de Nice.

Ha cappello da convesso spianato, col centro quasi sempre rialzato ad umbone, secco, color marrone tendente nello sfondo al rossastro, tutto coperto da eleganti squame del medesimo colore; lamelle spesse, bianche, nel fungo adulto pagliarine, verso il gambo sinuato-aderenti (smarginate), talvolta coperte da goccioline resinose giallognole; gambo solido, verso la base attenuato-radicato, sopra l'anello bianco e come cruscoso, sotto l'anello a squame circolari seure, simili a quelle del cappello; carne bianca, compatta, di odore grato di frutta e di sapore dolce-amaro; basidii cilindraceo-subclavati, 40-45 μ 6-8 μ ; spore bianche, ovato-sferiche, con goccia oleosa, 6-5 μ .

Nasce a preferenza nelle selve di Abete bianco (Avez), per lo più solitario.

È poco conosciuto e perciò non ha da noi un nome volgare. Nel Litorale mediterraneo, dove è più frequente, viene raccolto assieme all'Agarico robusto, col quale è confuso e perciò chiamato col medesimo nome di Caussetta. È *mangereccio* ed ha le medesime proprietà e il medesimo gusto dell'Ag. robusto.

Spiegazione delle figure: *a* Due individui nel primo sviluppo. *b* Individuo sviluppato. *c* Individuo sezionato. *d* Basidii. *e* Spore.

ARMILLARIA AURANTIA Schaeff. — Tav. XVIII.

Ital. Agarico ranciato.

Ha cappello convesso, poi spianato con leggero umbone, viscoso a tempo umido, colore ranciato-fulvo o ocraceo-fulvo,

tutto coperto da piccole squame concolori; lamelle spesse, bianche, poi a macchie ferruginee o fulve, al gambo sinuate ed attaccate sullo stesso ad uncino; gambo solido, talora però nel fungo adulto diventante cavo, sopra l'anello bianco e cruscoso, sotto coperto da squamette identiche a quelle del cappello; anello incompleto, squamiforme e non già membranaceo come nell'*Armillaria robusta* e calzata; carne bianca con tinta quadrello ai lati, di odore forte d'olio rancido o di cimice e di sapore dolceigno; basidii clavati, 25-28 μ . 4-5 μ .; Spore subglobose, 5-6 4-5 μ .

Nasce a preferenza nelle selve di Abete bianco per lo più in grandi truppe. Osservato superficialmente è facile confonderlo coll'*Armillaria robusta*, dalla quale però si distingue specialmente per l'odore nauseante, per la viscosità, per le squame e per l'anello non membranaceo. All'osservazione microscopica si trova diversità anche nelle spore ecc.


È specie *sospetta* da tralasciarsi, quantunque non si possa dichiarare venefica, giacchè in certi luoghi viene mangiata senza pericolo dopo essere stata cotta e macerata nell'acqua. Convien rimarcare che cuocendosi i funghi nell'acqua salata perdono gran parte dei principi drastici, che contengono, e se, dopo cotti, si getta via l'acqua e si condiscono, riescono innocui. Questo metodo, per lo più usato dai contadini, se è più sicuro per garantirsi dagli avvelenamenti, ha però l'inconveniente di rendere i funghi insipidi e più indigesti pel motivo che perdono il gusto gradito e delicato, nonchè parte degli elementi nutritivi.

Spiegazione delle figure: *a*, *b*, *c*, Individui di vario sviluppo. *d* Sezione verticale d'un individuo. *e* Basidii. *f* Spore.


ARMILLARIA IMPERIALIS. Fr. Tav. XIX

Ital. Agarico imperiale. Volg. Brise matte (a Trento).

Nel primissimo sviluppo ha il cappello quasi rotondo e strettamente unito al gambo mediante la volva membrana-



Armillaria aurantia Schaeff. Agarico ranciato
 { SOSPETTO }



Armillaria imperialis Fr. Agarico imperiale

cea che aderisce ai margini; intieramente sviluppato poi è disteso e spianato, assumendo dimensioni talora molto grandi da raggiungere in diametro 20 *cm* e più. Il colore del cappello è castagno, variando in intensità a misura dello sviluppo, e l'epidermide, da prima contigua, si sfiltra in squame eleganti specialmente al centro; le lamelle sono bianche, spesse, grossette, forcate, talora al taglio crenolate, scorrenti sul gambo; il gambo è solido, duro, verso la base attenuato e radicato profondamente nel terreno; l'anello sta in basso vicino alla volva, è riflesso, al di sotto bruno-fibroso, al di sopra bianco, striato-soleato; la volva è membranacea, tenace, in età lacerata, color paglierino sporeo; carne biancastra, compatta, del gambo dura; basidii clavati, 50-68 μ ; spore allungate, 12-14 : 5-7 μ .

Nasce copioso a truppe in tutte le selve di abete della regione tridentina.

È una delle poche specie che vengono portate sul mercato di Trento, dove si vende sotto il nome di Brise false o Brise matte. Come fungo *mangereccio* è di poco valore per la carne troppo tenace e di sapore non tanto gradito. Riesce invece abbastanza gustoso come guarnizione (appresso) se si prepara nel modo seguente:

Si scelgono possibilmente individui del medesimo sviluppo, si mondano raschiando la pelle del cappello e del gambo e si tagliano a pezzi cubici (a forma di dado) della dimensione di circa 3 *cm*. Indi si lavano, si pongono nell'acqua e aceto con sale e si fanno bollire finchè abbiano raggiunto un terzo circa di cottura, indi si colano e si mettono nell'olio con un po' di aceto e si fanno nuovamente bollire per 7 o 8 minuti. Subito questo trattamento, si versa il tutto in un vaso di terra cotta, osservando che i funghi rimangano tutti sotto olio, e quindi si ripongono. Dopo cinque o sei giorni possono essere serviti come guarnizione della carne ecc.

Spiegazione delle figure: *a* Fungo giovane. *b* Fungo di mezzo sviluppo. *c* Sezione verticale. *d* Basidii e Spore.

ARMILLARIA MELLEA Wahl. Tav. XX.


Ital. Famiglia buona, bianca e leonata. Volg. Fonghi del morar, Ciadini, Ciadini de morer. Franc. Tête de Méduse. Ted. Hallimasch.

Nel primo sviluppo ha la forma di chiodo pel cappello conico arrotondato ai margini, poi piano-convesso, indi spianato con umbone nel centro, di vario colore a seconda della matrice, cioè giallo-melleo se cresce al piede dei gelsi, rossastro-carne se ai piedi o su tronchi marciti di conifere, bruno se ai piedi di roveri ecc. È tutto coperto da fiocchi di peli o piccole squame nerognole o giallastre che poi spariscono nel fungo adulto; lamelle attenuate alle due estremità e scorrenti a meino sul gambo, bianche, poi con tinta rosea e chiazze rossastre; gambo eguale, alla base per lo più compresso, pieno d'una sostanza spongiosa, sopra l'anello di colore carnicino pallido, sotto giallastre o bruno; anello fioccoso, bianco, a fiocchi giallastri; carne bianca, acidetta; basidii clavato-capitati, 30-40 6-7 μ .; spore ellittiche, 7-8 4-6 $\frac{1}{2}$ μ .

Cresce al piede o sulle ceppaie di vari alberi, specialmente Gelsi, Salici, Abeti, Larici, Quercie ecc. in ottobre e novembre, per lo più in grandi cespi da 10-30 individui. Raramente si trova solitario, ed allora assume dimensioni maggiori e il piede alla base diventa bulboso.

La carne di questo fungo è un po' acida, poco compatta e nel gambo fibrosa, per cui, quando si trova bene sviluppato, si deve sempre rigettare la parte inferiore dei gambi riuniti a cespo. È dovunque conosciuto come *mangereccio* e si consuma in gran quantità; però non è da considerarsi tra le specie migliori.

Da questo micete è causata la mortalità dei gelsi, conosciuta in Italia col nome di *male del Falchetto*, investendo



Armillaria mellea Vahl. (Famiglia buona, bianca e leonata)

il suo micelio, che si presenta sotto forma di filamenti bianchi o di una membrana bianca, le radici dell'albero e facendole marcire.

Avvertimento. Le denominazioni volgari, che si danno ai funghi mangerecci, se tolte dal nome degli alberi sui quali crescono, sono sovente occasione di accidenti deplorabili, come p. es. il nome dato all'Armillaria mellea di *Fonghi del morar*, perchè facilmente infiltra nel volgo la falsa idea che tutti i funghi, i quali si sviluppano sul gelso sieno da riferirsi a questa specie mangereccia, mentre invece crescono su quest'albero molte altre specie, anche sospette o venefiche. Le quali poi raccolte e mangiate producono disturbi gravissimi o avvelenamenti, che a torto si attribuiscono ai *Fonghi del morar* in quanto riguardano la specie buona. Una specie mangereccia è sempre tale, purchè, come già accennai altrove, si rigettino gli individui troppo attempati che incominciano a putrefarsi. Se quindi si hanno a deplorare inconvenienti, se lo deve attribuire a specie nocive che furono confuse colle buone, perchè nascevano nei medesimi luoghi, sui medesimi alberi o presentavano un aspetto simile. Convien quindi badare non all'albero su cui cresce il fungo, nè al luogo dove si trova o alla esteriore parvenza, ma alle note che presenta la specie che si ritiene mangereccia, e confrontarle colla descrizione e colle figure che qui si danno. Sul gelso cresce anche una specie che è nociva, l'Agarico amaro (*Hypophoma fasciculare* Huds.), il quale forma pure dei grandi cespi somiglianti a quelli dell'Armillaria mellea, ma che però, se si bada soltanto un poco, non può essere confuso colla stessa, perchè ha caratteri affatto diversi. Ritengo che a questo fungo sieno da attribuirsi la maggior parte degli avvelenamenti che si riferiscono ai *Fonghi del morar*.

Spiegazione delle figure: *a* Gruppo di funghi in vario stadio di sviluppo. *b* Individuo sezionato. *c* Basidii. *d* Spore.

Genere *Tricholoma*.

Funghi carnosì con cappello e gambo, senza anello e senza volva; tessuto del gambo omogeneo, cioè congiungentesi con quello del cappello; lamelle al luogo d'inserzione sul gambo scavate a seno (smarginate, sinuate), non scorrenti sullo stesso; spore *bianche*, per lo più ellittiche, sovente con la membrana esteriore (episporio) granulata.

TRICHOLOMA ACERBUM Bull. Tav. XXI.


Ital. Agarico acerbo. Volg. Orletto (Lombardia) Carnio, Padoan bianco (Veneto). Franc. L'Acerbe.

Ha cappello da convesso spianato coll'orlo tomentoso e quasi sempre rivolto verso le lamelle (onde il nome di *Orletto*), fornito di rialzi pure tomentosi e gocce viscose nel fungo giovane, di colore bianco-giallastro o giallo-paglierino, con centro nocciola o fulvastro, d'aspetto sericeo; lamelle spesse, posteriormente (al gambo) smarginate, da prima bianche, poi a chiazze color quadriello; gambo solido, eguale o più sovente attenuato alla base, qualche volta anche bulboso, giallicio, all'apice coperto da squamette furfuracee, bianche o giallo-zoffino; carne bianca, di sapore amarognolo-acerbo; basidii clavati, 25-30 \times 5-7 μ ; spore obovate, vitree, con goccia oleosa, 6-7 \times 3-3 $\frac{1}{2}$ μ .

Nasce in tutta la nostra regione nelle selve di conifere o anche nei boschi a foglia per lo più in famiglie o riunito in cespi di due a quattro individui, a tardo autunno.


È *mangereccio*, ma deve cuocersi bene; ed affinchè perda l'acerezza, prima di condirlo sarebbe meglio farlo bollire fino a mezza cottura nell'acqua salata, indi colarlo e cuocerlo col metodo ordinario.

Spiegazione delle figure: *a* Fungo giovane. *b* Fungo adulto. *c* Sezione verticale. *d* Basidii. *e* Spore.



Tricholoma acerbum Bull. (Agarico acerbo. Orletto)

(SOSPETTO)



Tricholoma Russula Schaeff. Agarico avvinato

TRICHOLOMA RUSSULA Schaeff. Tav. XXII.

Ital. Agarico avvinato, Avvinato. Volg. Carniol roân, Padoan rosso (Veneto). Franc. Rouget. Ted. Stocktäubling.

Ha cappello da convesso-spianato, leggermente viscoso a tempo umido, colore carnicino, tutto coperto da piccole squame concolori; lamelle non tanto spesse, molli, bianche, poi macchiate di rosso, verso il gambo ora rotodate, ora smarginate o attaccate, sovente anche scorrenti leggermente sullo stesso; gambo pieno, eguale o ventricoso alla base, bianco, con tinta o macchie del color del cappello, all'apice bianco-furfuraceo; carne bianca, al taglio diventante carnicina, poi ritornante bianca, di buon gusto; basidii cilindraceo-clavati, 45-60 μ , spore ellittiche, vitree, 6-7 μ .

Nasce nei boschetti a foglia negli autunni molto piovosi per lo più in cespi di 2-4 individui.

È fungo *assai gustoso* e presto cotto. Si può confondere, se si osserva soltanto il colore, con qualche *Rossola* venefica, come la *Russula rubra*, sanguinea o emetica; ma questi funghi sono fragili, hanno le lamelle secche, non molli e la carne aere. Basta quindi, nel dubbio, assaggiarli e, se si presentano pungenti al palato, rigettarli. Ha pure molta somiglianza coll'*Igroforo* avvinato (*Hygrophorus crubescens*), anzi talvolta riesce difficilissimo distinguerlo, ma tale scambio non apporterebbe danno, giacchè quest'ultimo è pure mangereccio. Chi però volesse distinguerlo osservi che l'*Igroforo* avvinato cresce soltanto nelle selve conifere, non è così regolarmente tinto di color carne, ma su fondo bianco ha chiazze rosse, il gambo è più snello, tutto puntato di rosso, e la carne al taglio diventa giallocitrina e non rossa come nell' *Agarico* avvinato.

Spiegazione delle figure: *a* Fungo giovane. *b* Fungo adulto. *c* Sezione verticale. *d* Basidii. *e* Spore.

TRICHOLOMA COLUMBETTA Fr. - Tav. XXIII.

Ital. Agarico colombetta. Volg. Colombetta. Franc. Colombette. Ted. Seidenglänzender Blätterschwamm.

Ha cappello da obovato-spianato, liscio, secco, sericeo, bianco-candido, per lo più con macchie rosse o celestine, o verde-rame; lamelle spesse, bianche, sovente con tinta rosea al margine del cappello, al gambo smarginate; gambo pieno e qualche volta diventante cavo negli individui adulti, alla base ingrossato, raramente un po' radicato, bianco, leggermente pruinato, in età liscio o fibrilloso, verso la base quasi sempre con macchie celestine o verde-rame; carne bianca, compatta, gustosa; basidii clavati, 25-30 . 6-8 μ , spore ellittiche, ialine, 6-7 . 4 μ .

Nasce nelle selve di conifere in settembre e ottobre dopo le grandi piogge. Negli autunni poco piovosi è raro o manca affatto.

È *mangereccio*, di sapore delicato e merita d'essere ben conosciuto e raccolto. Non è facile confonderlo con specie nocive se si bada alle note caratteristiche che lo distinguono.

Spiegazione delle figure: *a* Fungo giovane. *b* Fungo adulto. *c* Fungo sezionato. *d* Basidii. *e* Spore.


TRICHOLOMA TERREUM Schaeff. Tav. XXIV.

Ital. Agarico terreo. Volg. Morette (Val di Non), Cavarese (Veneto). Franc. Agaric drapé noir. Ted. Erdfarbiger Blätterschwamm.

Ha cappello da campanulato spianato-umbonato, secco, di colore nerognolo, grigio-sorcio o grigio-cinereo, da prima peloso, poi a squamette concolori; lamelle spesse, bianco-cineree, a chiazze fosche nel fungo adulto, al gambo smarginate; gambo pieno, poi cavo, di colore bianco-cinereo, oscurantesi coll'età alla base, eguale, fibrilloso, all'apice bianco o nero fufuraceo; carne bianco-cinerea, di leggiero odore



Tricholoma columbetta Fr. Colombetta!



Tricholoma tigrinum Schaeff. (Agaricaceae)

(VELENOZO)

Bresadola dis.

farinaceo e sapore non marcato; basidii clavati, 25-30 \times 6-8 μ , spore ellittiche, ialine, 6-8 \times 4 μ .

Nasce copioso in autunno, specialmente nelle pinete campestri, in famiglie, gregario o raramente in cespi di 2-3 individui.

È fungo *mangereccio* di buonissimo gusto, e si cuoce perfettamente in un'ora. Si può confondere col *Tricholoma virgatum* (Tav. XXVI) e col *Tricholoma tigrinum* (Tav. XXV), specie sospette, le quali però non crescono mai in famiglie così numerose, nè sono così fragili come l'Agarico terreo. Se si confronteranno attentamente le descrizioni e le figure che presentiamo, sarà escluso ogni pericolo di confonderli.

Spiegazione delle figure: *a* Individuo giovane. *b* Individuo adulto. *c* Individuo sezionato. *d* Basidii. *e* Spore.

TRICHOLOMA TIGRINUM. Schaeff. (non Fr.) — Tav. XXV.

Ital. Agarico tigrato. Franc. Agaric tigré. Ted. Getiegerter Blätterschwamm.

Ha cappello da campanulato-spianato e largamente umbonato, di colore grigiastro-chiaro, secco, sericeo-fibrilloso, indi a squame fiocose grigio-scure; lamelle spesse, larghe, al gambo smarginato-uncinate, colore bianco-sporco con riflesso glauco; gambo solido, robusto, sovente ventricoso, bianco-grigiastro, fibrilloso e talora a squamette puntiformi, brune; carne bianco-grigiasta, di nessun sapore o odore speciale; basidii clavati, 40-50 \times 9-8 μ ; spore ellittiche o ovato-allungate, 8-10 \times 6 μ .

Nasce nelle selve di abete in piccole famiglie o anche isolato, ma non tanto frequente.

È specie *velenosa*, per cui si deve por mente di non confonderlo coll'Agarico terreo, del quale sembra una forma più grande e compatta.

Spiegazione delle figure: *a* Individuo giovane. *b* Individuo adulto. *c* Individuo sezionato. *d* Basidii. *e* Spore.

TRICHOLOMA VIRGATUM Fr. — Tav. XXVI.

Ital. Agarico vergato. Franc. Agaric vergeté.

Ha cappello da conico-campanulato piano convesso e umbonato, di color pallido-cinereo, secco, tutto coperto da fibrille longitudinali scure; lamelle spesse, bianco-cineree, facilmente staccabili dal cappello, al taglio tomentose, verso il gambo rotundate e attaccate ad uncino; gambo pieno, poi cavo, alla base clavato o bulbosetto, di colore bianco-cinereo, leggermente fibrilloso-furfuraceo; carne biancastra, un po' scura sotto l'epidermide, di odore non marcato, e sapore un po' astringente; spore ialine, subglobose, $9-8 \frac{1}{2}-6 \mu$.

Nasce nelle selve di abete, ma raro, per lo più in gruppi di pochi individui.


È specie *sospetta*. Si può anche questo confonderlo col l'Agarico terreo, e perciò ne ho dato la figura. Del resto tanto questa specie, quanto l'Agarico tigrato, non trovandosi mai in famiglie numerose, sarà facile distinguerli anche praticamente dall'Agarico terreo. Si osservi inoltre che l'Agarico vergato non è mai peloso, come l'Agarico terreo, nè ha la carne così fibrosa, ma compatta; anche le fibre del cappello sono di tutt'altra specie di quelle del cappello dell'Agarico terreo.

Spiegazione delle figure: *a-c* Individui in vario grado di sviluppo. *d* Individuo sezionato. *e* Spore.

TRICHOLOMA SULPHUREUM Bull. — Tav. XXVII.

Ital. Agarico zoffino. Franc. Sulphurin puant.

Ha cappello da convesso o campanulato-spianato ed umbonato, da sericeo glabro, di colore zoffino-sporco col centro rosso-mattone; lamelle distanti, colore zoffo-carico, al piede smarginato-uncinate; gambo pieno, poi cavo, eguale o un po' panciuto alla base, fibrilloso, del medesimo colore del cappello; carne pure concolore, di odore forte nauseante da cloro; basidii clavati, $35-40 \approx 9-10 \mu$; spore a forma di mandorla, $9-10 \approx 5 \mu$.




Tricholoma virgatum Fr. (Agarico vergato)

(VELEROCO)



Tricholoma sulphureum Bull. (Agarico zolfino)

(VELENOSO)



Tricholoma Georgii Clus. (Prugnolo)

Nasce tanto nelle selve conifere, quanto nei boschi a foglia in piccole famiglie dall'agosto all'ottobre.

È *velenoso*; però riesce facile conoscerlo dall'odore acuto e ripugnante che tramanda.

Spiegazione delle figure: *a-c* Individui nel vario grado di sviluppo. *d* Individuo sezionato. *e* Basidii. *f* Spore.

TRICHOLOMA GEORGI Chs. (*Agaricus gambosus* Fr.

Agaricus albellus DC.) — Tav. XXVIII.

Ital. Prugnolo, Prugnolo nostrale color d'Isabella. Volg. Spinarolo, Muggengo, Fungo della Saetta. Franc. Mousseron. Ted. Musseron, Maischwamm, Rossling.

Ha cappello da prima quasi rotondo, poi convesso, indi spianato, coi margini rivolti verso le lamelle, con superficie secca, generalmente di color nocciuola languido, variando però dal bianchiccio all'oceraceo: lamelle spesse, bianche, nel punto d'inserzione sul gambo varianti, ora smarginate, ora attenuato-uncinate o leggermente decorrenti, sovente anche rotondate; gambo solido, eguale o attenuato verso la base, talora anche bulbosetto, bianco, con tinta nocciuola nella parte inferiore, fibrilloso, all'apice furfuraceo; carne compatta, bianca, odorosa, nel gambo un po' fibrosa: basidii clavati, 25-30 6-8 μ ; spore ovato-ellittiche, ialine, 5-6 3 μ .

Nasce nei luoghi aprichi fra i cespugli e più sovente negli erbosi, ne' pascoli, prati magri, in primavera da aprile alla fine di maggio, abbastanza frequente. Si trova ordinariamente in file longitudinali a zig-zag (onde il nome di fungo della Saetta) o circolari concentriche, segnate ancora prima di nascere dallo sviluppo dell'erba, che vi cresce più rigogliosa e con tinta verde-cupo, perchè nutrita dal micelio del fungo.

Il Prugnolo è uno dei funghi *mangerecci* più saporiti e gustosi che si conoscano. Si presta specialmente per essere disseccato e quale condimento, giacchè conserva l'aroma piccante che ha da vegeto e lo comunica facilmente

ai cibi coi quali si unisce. Il metodo che si usa per essiccarlo si è di tagliarlo in due o quattro parti fino alla metà del gambo, indi viene infilato con accia ed esposto all'aria.

Merita di esser ricordata una varietà dello stesso che trovai a mezza montagna e che da alcuni autori si ritiene specie propria, che si denomina *Tricholoma graveolens* Pers. Ha la medesima forma della specie; differisce soltanto nel colore generale che è fuliginoso, più carico nelle lamelle. L'odore è pure un po' più piccante. Del resto ha le medesime proprietà mangerecce. Essendo la carne assai compatta tanto della specie che della varietà, e coll'essiccazione diventando un po' coriacea, si deve bene cuocere altrimenti riescirebbe indigesta, specialmente negli essiccati.

Non si può confondere con specie venefiche.

Spiegazione delle figure: *a-c* Individui in vario grado di sviluppo. *d* Individuo sezionato. *e* Basidii. *f* Spore.

TRICHOLOMA GONIOSPERMUM Bres. — Tav. XXIX.


Ital. Agarico a spore angolate. Volg. Fungo di Penede.

Ha cappello da emisferico piano-convesso, secco, da prima fosco, poi giallo sporco o colore isabella; lamelle spesse, grigio-fuliginose o più raramente lilacino-violacee, indi giallastre, al gambo rotondato-smarginate; gambo solido, eguale o un po' ventricoso, raramente bulboso, pruinato, all'apice bianco o lilacino, alla base scuro; carne compatta nel cappello, fibrosa nel gambo, bianco-sporca, di odore forte di farina un po' rancida, sapore dolciastro; basidii clavati, 35-40


8-9 μ .: spore angolate, quasi a forma di croce, 8-10 5-7 μ .

Nasce in primavera e in autunno a grandi famiglie nei boschetti del colle di Penede fra Nago e Torbole, dove finora fu unicamente trovato.

È *mangereccio* e si avvicina per la forma e per il gusto al Prugnolo, dal quale differisce per l'aroma meno pronunciato e per la carne meno compatta. È da annoverarsi fra



Trichotoma goniosperma Bres. (Agarico a spore angolate)



Tricholoma nudum Bull. (Agarico nudo)

le specie più squisite. Si può anche disseccare con buon risultato. Non esiste specie velenosa da confondersi collo stesso, il quale d'altronde, per chi potesse usare del microscopio, sarebbe subito distinto dalla spora angolata, propria di questa specie di *Tricholoma*.

Spiegazione delle figure: *a-c* Individui di vario sviluppo. *d* Individuo sezionato. *e* Basidii. *f* Spore.

TRICHOLOMA NUDUM Bull. Tav. XXX.

Ital. Agarico nudo. Franc. Agaric nu. Ted. Nackter Blätterschwamm.

Ha cappello da convesso-spianato e depresso nel centro, umido ma non viscoso, di color violaceo-oscuro, col centro a tinta rossastro-quadrello, impallidentesi coll'età; lamelle spesse, color violaceo vivo, persistente, al gambo rotondato-uncinate, a uncino talora lunghetto e decorrente sul gambo; gambo pieno, del medesimo colore, fibrilloso-peloso, alla base sovente un po' ingrossato; carne violaceo-chiara, di odore appena marcato e sapore leggermente acidulo; basidii clavati; spore ellittiche, jaline, 6-7 = 4-5 μ .

Nasce gregario al margine delle selve dal maggio all'ottobre.

È specie *abbastanza buona*; conviene però cuocerla bene, giacchè la carne, quantunque sembri molle, è un po' fibrosa e perciò più difficile a cuocersi. Si può facilmente confondere pel colore con alcune specie di Cortinari (p. e. *Cortinarius cyanopus*, *C. caeruleus*, *C. purpurascens*, *C. violaceus*, *C. cyanites* ecc.) i quali sono sospetti, ma se si osserva un po' accuratamente non riuscirà difficile il distinguerlo dal cappello che non è mai viscoso e dalle lamelle che rimangono sempre violacee, mentorchè nei Cortinari, pel motivo che hanno le spore colorate, diventano da violacee color ruggine nel fungo sviluppato. Inoltre i Cortinari sono sempre provisti nel fungo giovane di anello fi-

broso a modo di velo, il quale manca sempre nell'Agarico nudo.

Spiegazione delle figure: *a* Fungo veduto di prospetto. *b* Fungo veduto colla faccia inferiore. *c* Fungo sezionato. *d* Basidii. *e* Spore.

TRICHOLOMA CXISTA Fr. (*Agaric grammopode* Bull.
fav. 585 f. 1) Tav. XXXI.

Ital. Agarico montano.

Ha cappello da emisferico convesso-gibboso, poi espanso-umbonato, glabro, secco, bianco, sovente con tinta paglierina specialmente al centro; lamelle spesse, bianche e coll'età traenti al grigiastro, al piede smarginato-uncinate, facilmente staccabili dal cappello; gambo pieno, eguale o un po' bulboso alla base, fibrilloso, all'apice furfuraceo, bianco; carne tenera, fibrosa nel gambo, bianca, talora al taglio diventante carnicino-pallida, di buon sapore ed odore di funa fresca; basidii clavati, 30-35 μ ; spore ellittiche, juli., 7-9 μ .


Nasce nei pascoli, luoghi erbosi, campigoli di montagna, dal maggio all'autunno, sovente in famiglie numerose.

È una delle specie *più delicate* dei nostri monti e merita di essere conosciuta meglio. Io non la vidi mai raccogliere. Non si può confondere con funghi venefici. Il solo che gli somiglia, l'Agarico bianco (*Tricholoma album* Schaeff.), non si trova mai in simili località, ma sempre nelle selve; inoltre, come già accennai altrove, questa specie è rarissima dovunque.


Spiegazione delle figure: *a* Individuo veduto di prospetto. *b* Individuo veduto colla faccia inferiore. *c* Individuo sezionato. *d* Basidii. *e* Spore.

TRICHOLOMA GRAMMOPODIUM Bull. (Tav. 548). Tav. XXXII.


Ital. Agarico a piede striato. Volg. Fonghi della Saetta de auton. France. *Agaric grammopode*.



Tricholoma cnista Fr. var. *gracilis* (Agarico montano)



Tricholoma grammopodium Bull. (Agarico pedestriato)



Clitocybe nebularis Batsch. (Agarico nebuloso)

Ha cappello da campanulato espanso-gibboso o umbonato, glabro, non viscoso, a tempo umido molle, di colore fosco tanò, a tempo secco con pelle morbida come pelle di guanto, di colore grigiastro-scuro, grigiastro pallido o traente al cinereo; lamelle spesse, bianche, larghe, verso il gambo rotondato-attaccate o smarginato-uncinate; gambo robusto, assai variante nella lunghezza, pieno, pallido, longitudinalmente striato da fibrille scure; carne biancastra, di sapore grato ed odore di farina fresca un po' rancida; basidii clavati; spore ellittiche, asperule, bianche, 9-10 x 5 μ .

Nasce nei luoghi erbosi e nei prati in autunno dopo il taglio dei fieni in grandi famiglie, per lo più disposto in file. Tramanda dalle lamelle una abbondante polvere seminale bianca, che talvolta colora l'erba circostante, come fosse dispersa di farina.

È fungo *mangereccio* di buon gusto; conviene però rigettare la parte inferiore del gambo che è troppo fibrosa e tenace. Non vi sono funghi venefici coi quali possa essere confuso.

Spiegazione delle figure: *a-b* Individui in vario grado di sviluppo. *c* Individuo sezionato. *d* Basidii. *e* Spore.

Genere *Clitocybe*.

Funghi carnosì con cappello e gambo, senza anello e volva; tessuto del gambo omogeneo, entrante in quello del cappello; lamelle al gambo attenuate e scorrenti più o meno sullo stesso; spore *bianche*, globose, ovate o ellittiche, lisce, raramente con episporio granulato o aculeato.

CLITOCYBE NEBULARIS Batsch -- Tav. XXXIII.

Ital. Agarico nebuloso. Franc. Agaric nebuloux.

Ha cappello da convesso-gibboso spianato, di colore grigiastro-nebbia col centro fosco, glabro, secco; lamelle spesse,

strette, scorrenti sul gambo, bianche, facilmente staccabili dalla carne del cappello; gambo pieno, biancastro, traente al grigio, alla base bulboso, fibrilloso-pruinato, poi glabro; carne bianca, di odore di farina fresca e di sapore dolcigno; basidii clavati; spore ovato-allungate, jaline, 6-7 μ .

Nasce nelle selve, per lo più ai margini erbosi, in cerchio o in gruppi di parecchi individui.


Non sono concordi i pareri degli Autori sulle qualità di questo fungo. Chi lo dice sospetto, chi mangereccio, chi lo ritiene innocuo se mangiato in poca quantità e nocivo se mangiato in quantità straordinaria. Il fatto sta che veri casi di avvelenamento con questo fungo non si conoscono, e che al più può riuscire indigesto o causare qualche disturbo se mangiato troppo abbondantemente. Io me ne cibai parecchie volte, sempre però in dosi mediocri, e non ebbi a soffrire disturbo alcuno.

Spiegazione delle figure: *a-b* Individui in vario grado di sviluppo. *c* Individuo sezionato. *d* Basidii. *e* Spore.


CLITOCYBE CONGLOBATA Vitt. (*Agaricus coalescens*
Viv.) — Tav. XXXIV.

Ital. Agarico conglobato, Agarico a cespuglio. Volg. Zonati (Val di Non).

Ha cappello da convesso spianato-depresso o anche leggermente umbonato, nel fungo giovane color bianchiccio, indi grigio-chiaro o grigio-scuro, longitudinalmente striato; lamelle bianche, poi grigie, congiunte nel fondo a vene, verso il gambo rotondato-attaccate o sinuate-annesse o anche decorrenti sullo stesso; gambo pieno, bianco, fufuracco, alla base sempre unito coi gambi di altri individui (crescendo sempre in cespi) in un tubero carnoso, compatto, informe, sotterraneo, della dimensione da 5-10 *cm.*; carne bianca, compatta, di grato sapore e odore non sensibile; basidii clavati, 40-45 \times 7-9 μ .; spore sferiche, jaline, 6-7 μ di diametro.



Clitocybe conglobata Vittad. (Agarico conglobato)



Clitocybe cinerascens Bull. Agarico cinerognolo

Nasce in autunno ed è frequente nelle pinete della Valle di Non. Altrove finora non lo trovai: in Italia fu raccolto nel milanese (Vittadini) e nel genovese (Viviani).

È conosciuto volgarmente nel Trentino sotto il nome di *zonati* e *si mangia* in tutti i luoghi dove cresce. La sua carne è un po' tenace, e perciò conviene cuocerlo bene e con abbondante condimento, ed allora riesce veramente squisito.

Spiegazione delle figure: *a* Cespo di funghi in vario stadio di sviluppo nascenti dal medesimo tubero, il quale fu sezionato in *b* onde apparisca come è sviluppato. *c* Sezione verticale d'un cappello e tronco di gambo. *d* Basidii. *e* Spore.

CLITOCYBE CINERASCENS Bull. (non Fr.) - Tav. XXXV.

Ital. Agarico cinerognolo. Franc. Agaric cinerescens.

Ha cappello da convesso spianato-gibboso o anche depresso, ondulato al margine, di colore grigio-cinereo più o meno oscuro conforme l'età; lamelle spesse, bianche, poi con tinta grigiastria, verso il gambo variabili, quando sinuato-attaccate, quando troncato-aderenti, quando leggermente decorrenti; gambo pieno, bianchiccio, alla base unito ad altri gambi, ma senza formare tubero; carne biancastra, di sapore un po' amarognolo; basidii clavati, 30-35 \times 7-9 μ .; spore globose, jaline, 6-7 μ di diametro.

Nasce in grandi circoli a cespi di 3-15 individui, raramente solitario, in quasi tutte le selve tanto di conifere, che di foglia.

È *mangereccio* ed ha le medesime proprietà dell'Agarico conglobato, dal quale differisce quasi unicamente per la mancanza di tubero alla base. Anche questo fungo deve essere ben cotto per renderlo più gustevole ed evitare che riesca indigesto. Non si può confondere con specie nocive.

Spiegazione delle figure: *a-b* Due cespi di funghi in vario stadio di sviluppo. *c* Individuo sezionato. *d* Basidii. *e* Spore.

CLITOCYBE CARTILAGINEA Bull. (*Agaricus effocattellus*
Maur.) - Tav. XXXVI.

Ital. Agarico cartilagineo, Sfogatello. Franc. Agaric cartilagineux.

Ha cappello da convesso spianato-depresso o umbonato, da prima quasi nero, indi castagno-marrone e finalmente castagno-chiaro, coll'epidermide tenace, quasi cartilaginea; lamelle spesse, verso il gambo attaccate o sinuate, sovente anche un po' decorrenti sullo stesso, tenaci come l'epidermide del cappello, bianchiccie, con tinta grigia o paglierina; gambo pieno, in età anche cavo, nella parte superiore biancastro, inferiormente nereggiante e unito a cespo con altri gambi, colla superficie pure tenace, quasi cartilaginea; carne bianca, di odore non tanto gradito e sapore dolciigno; basidii clavati, 30-35 μ .; spore globose, ialine, 6-8 μ . di diametro.

Nasce nelle pinete della zona della vite (Val di Non, Sopramonte ecc.), per lo più in grandi famiglie e a cespi di 5-20 individui. In Italia è frequente nella provincia di Roma.

È *mangereccio*, ma molto tenace, per cui si deve cuocere molto (2-2½ ore) con abbondante condimento, ed allora riesce del medesimo gusto dell'Agarico cenerognolo. Non si può confondere con specie ventiche.

Spiegazione delle figure: *a* Cespo di funghi in vario stadio di sviluppo. *b* Individuo sezionato. *c* Basidii. *d* Spore.

CLITOCYBE CONNATA Schum. - Tav. XXXVII.


Ital. Agarico connato. Franc. Agaric rameux.

Ha cappello da convesso spianato-depresso o anche leggermente umbonato, al margine ondulato-repando nei funghi molto sviluppati, glabro, secco, di colore dal bianco-candido al grigio-cinereo; lamelle non tanto spesse, bianche o tendenti al cinereo-fusco, verso il gambo variamente inserite,


a.



Clavocyne cartilaginea Bull. (Agaricus cartilagineus)



Clitocybe connata Schum. Agarico - carnato



Agaricus (Peziza) umbellatus L. var. *umbellatus* L.

intieramente attaccate o smarginate, o decorrenti; gambo solido o in età cavo, bianco, fioccoso-pruinato, alla base congiunto in cespiti o anche in tubero con altri; carne bianca, di forte odore di farina recente, sapore mite; basidii clavati, 25-30 5-6 μ .; spore ovato-allungate, ialine, 6-7 2-3 μ .

Nasce a cespi nelle selve alpine (Rabbi, Selva di Dimaro, Paneveggio ecc.) dall'agosto all'ottobre.

È una delle specie *più squisite* e si presta anche per essere disseccata. Non si può confondere con specie nocive.

Spiegazione delle figure: *a* Cespo di funghi. *b* Individuo sezionato ed unito alla base col cespo. *c* Basidii. *d* Spore.

CLITOCYBE INFUNDIBULIFORMIS Bull. Tav. XXXVIII.

Ital. Agarico imbuto, Imbuto. Volg. Imbuto. Franc. La Coupe bocagère. Ted. Gelber Trichterschwamm.

Ha cappello da convesso-subemisferico espanso-ombelicato o imbutiforme, con umbone nel fondo quasi sempre persistente, al margine sovente con rialzi tomentosi, che lo rendono come striato, di color nocciuola o di pan cotto; lamelle spesse, strette, bianche, assai decorrenti sul gambo; gambo pieno, tenace, bianco, inferiormente con tinta nocciuola, un po' bulboso; carne bianca, tenace, di grato odore e sapore un po' astringente; basidii clavati, 30-35 6-7 μ .; spore ovato-sferiche, 5-6 3-4 μ .

Nasce nei luoghi erbosi, ne' pascoli e anche nelle selve di montagna dalla primavera all'autunno, per lo più in file.

È comunissimo dovunque e perciò, quantunque sia povero di carne, si può raccogliere con vantaggio offerendo un cibo sano e gustoso. Ha tendenza a divenire coriaceo, per cui si devono raccogliere soltanto gli individui freschi e giovani, rigettando gli adulti o già disseccati in piede. Si deve pure

ben cuocere (circa un'ora e mezzo) con abbondante condimento. Non si può facilmente confonderlo con specie ventiche. Si presta pure per essere disseccato, bastando tagliare per metà il cappello e passare per mezzo un filo sospendendolo per alcuni giorni all'aria. Disseccato si deve porre in luoghi asciutti entro sacchetti di carta o cassetine di legno.

Spiegazione delle figure: *a* Gruppo di funghi. *b* Individuo sezionato. *c* Basidii. *d* Spore.

CLITOCYBE GEOTROPA Bull. Tav. XXXIX.


Ital. Agarico geotrope. Volg. Fongo del Monte Brione (a Riva). Franc. Agaric géotrope.

Ha il cappello da prima convesso-umbonato o gibboso, col margine largamente involto verso il gambo, indi espanso e depresso, con umbone nel mezzo o anche senza, ed allora con forma di mezzo imbuto, di color isabella, giallo-carne o pane cotto; lamelle non tanto spesse, grosse, da prima attaccate, poi scorrenti sul gambo, bianche sul principio, ma poi quasi del colore del cappello; gambo solido, generalmente molto alto, robusto, del medesimo colore del cappello, alla base bulboso; carne bianca, di odore forte, assai grato, come di frutta (Calvil) e sapore non speciale; basidii clavato-capitati, 35-45 μ ; spore ovato-globose, ialine, 6-7 - 5-6 μ .


Nasce nei luoghi erbosi, pascoli, in grandi famiglie negli autanni molto piovosi, ma non dovunque (Sopramonte, S. Anna, Monte Brione presso Riva).

È uno dei funghi *più squisiti*, e pel forte aroma che possiede si può cuocere anche alla maniera dei tartufi servendosi come di questi per condimento. Si può pure facilmente disseccare alla maniera già indicata per l'Agarico imbuto. Non si può confondere con specie ventiche.

Spiegazione delle figure: *a-b* Due individui in diverso stadio di sviluppo. *c* Individuo sezionato. *d* Basidii. *e* Spore.



Clitocybe geotropa Bull. (Agarico geotropa)



Clitocybe candida Bresad. — *Agaricus candidus*

CLITOCYBE CANDIDA Bres. — Tav. XL.

Ital. Agarico candido.

Ha cappello da convesso-piano a forma di imbuto, con margine involuto, colore bianco-latteo, coll'età tingentesi di color paglia, quando è perfettamente sviluppato largo fino a 2 decimetri; lamelle molto spesse, assai strette, talora forcute, scorrenti sul gambo, bianche, poi paglia; gambo robusto, solido, del medesimo colore del cappello; carne bianca, compatta, di odore forte di farina fresca e sapore grato, mite, basidii clavati, 30-35 μ ; spore ovato-allungate, ialine, 7-8 μ .

Nasce in grandi file nei prati grassi, lungo i sentieri dove viene smossa la terra o anche al margine delle selve dove si trova terra pingue, p. es. nei campigoli delle malghe. Finora nel Trentino lo trovai soltanto nei prati della Valle di Rabbi e alle Vezzene di Malè. In Italia fu raccolto lungo il litorale mediterraneo.

Si presta come cibo e come condimento; ha la carne tenera, gustosissima ed aromatica. Anche disseccato riesce molto buono. Si può confonderlo con due specie di Lattario, il *Lactarius piperatus* e il *Lactarius vellereus*, funghi sospetti, coi quali ha comune la forma e il colore. Per distinguerlo basta tagliare gli esemplari per metà quando sono freschi; allora si scorge nei Lattarii una carne granulosa, rude e dura, dalla quale cola un abbondante succo lattiginoso bianco, di sapore acre-piperato, che infonde pure alla carne. Nell' Agarico candido invece la carne è sempre delicata, tenera, senza latte e di sapore mite.

Spiegazione delle figure: *a* Individuo quasi perfettamente sviluppato. *b* Individuo sezionato. *c* Basidii. *d* Spore.

Genere *Collybia*.

Funghi carnosotenaci con cappello e gambo, senza anello e senza volva; gambo fibroso-cartilaginoso, la cui trama è

omogenea a quella del cappello; lamelle al gambo libere o troncate e aderenti allo stesso nella parte superiore; spore *bianche*, lisce, obovate, allungate, o ellittiche.

COLLYBIA DRYOPHILA Bull. Tav. XLII.

Ital. Agarico drioifilo. Franc. Fausse Souchette. Ted. Ockerbrauner Blätterschwamm.

Ha cappello da convesso o campanulato spianato, col centro depresso o anche rilevato ad umbone e col margine quasi sempre rivolto verso le lamelle, secco, di colore generalmente di pan cotto, ma variante dal rossastro al giallastro-biancheggianti; lamelle spesse, strette, bianche o raramente a tinta zolfina, verso il gambo sinuato-aderenti o libere; gambo fistoloso, cioè già da prima vuoto nell'interno, fibrilloso-tenace, eguale o alla base tuberoso-radicalo, del color del cappello; carne pallida, di nessun odore o sapore speciale; spore bianche, ovato-irregolari, 5-6 μ .


Nasce in file a cespi o gruppi tanto nelle selve di conifere che a foglia, ma con preferenza nei querceti, dov'è abbondante in primavera ed estate.

È specie *abbastanza buona*, ma si deve usare soltanto il cappello e rigettare il gambo, perchè è troppo tenace e riuscirebbe indigesto.


Spiegazione delle figure: *a-c* Fungo in vario grado di sviluppo. *d* Individuo sezionato verticalmente. *e* Basidii. *f* Spore.

Genere **Pleurotus**.

Funghi carnosio-membranacei con cappello, ma talora senza gambo; cappello generalmente a forma di ventaglio, che s'inserisce immediatamente sulle matrici quando manca il gambo; gambo laterale o eccentrico, raramente fornito di anello, ma sempre senza volva; tessuto del gambo contiguo a quello del cappello; lamelle bianche, al gambo smarginate o



Collybia dryophila Bull. (Agarico driofilo)



Pleurotus fuscus (Batt.) Bres. var. *Ferulae* Ianzi (Cicciole)

scorrenti sullo stesso; spore *bianche*, cilindriche, ovate o globose, lisce o echinate.

Crescono sugli alberi o sulle radici di erbe, raramente sulla terra.

PLECROTUS FUSCUS (Batt.) Bres. var. FERULAE (Lanzi)

Comes. (*Ag. nebrodensis* Fr. *Ag. Eryngii* var. *Ag. Cardarella* var.) - Tav. XLII.

Ital. Fungo della Ferula, Felengo. Volg. Fungo della Bellamonte, Fungo d'Ampezzo. Ted. Ampezzaner-Schwämme (Bolzano).

Ha cappello convesso-gibboso, in età spianato e depresso, irregolare, sovente laterale o eccentrico, da prima di colore fosco fuliginoso, poi grigio-giallastro o grigiastro-lurido; lamelle non tanto spesse, bianche, con tinta paglia nel fungo adulto, scorrenti sul gambo e sovente reticolate; gambo solido, ventricoso-radicato, di color biancastro; carne compatta, bianca, di sapore grato e odore poco marcato nel fungo vegeto, ma molto profumata nel fungo disseccato; basidii clavati, 45-50 6-8 μ .; spore bianche, cilindracee o ovato-allungate, 10-14 \times 5-6 μ .

Nasce copioso nei prati montani della Bellamonte nella Valle di Fiemme e nei dintorni d'Ampezzo nel mese di settembre, dopo il taglio del fieno, sulle radici del *Laserpitium latifolium*.

È fungo *assai squisito*, e si usa a preferenza come condimento per il forte aroma che tramanda quando è disseccato. In tale stato si vende sul mercato di Bolzano, dove è conosciuto sotto il nome di Ampezzaner-Schwämme, e se ne ricava dai 6 agli 8 fiorini il chilogramma. Da noi non cresce che nei luoghi nei quali trovasi la pianta matrice, nell'Italia invece, Sicilia, a Cipro, in Tunisia e Algeria è molto più frequente perchè si sviluppa sulla radice di varie altre piante che non allignano nel nostro paese, come a dire la

Ferula communis, l'*Elacoselinum Asclepium* l'*Opoponax Chironium* ecc. Dovunque sono conosciute le sue proprietà mangerecce ed è ricercatissimo.

Spiegazione delle figure: *a-b* Fungo di vario grado di sviluppo. *c* Fungo sezionato verticalmente. *d* Basidii. *e* Spore.

PLEUROTUS OSTREATUS Jacq. Tav. XLIII.


Ital. Gelone, Cardella, Cerrena. Volg. Reccia de morar, Orgel (milanese), Ricchione (Napoli). Franc. Oreille du peuplier. Ted. Drehling.

Cresce a cespi coi cappelli imbricati e coi gambi uniti insieme e conati; la forma del cappello è di ventaglio o ovato-allungata; il colore è bruno-cinereo o grigiastro, nella parte posteriore verso il punto d'inserzione sui tronchi è coperto d'una lanugine biancastra; il gambo è laterale, conficcato nel tronco, talora assai corto da sembrare una specie di radice serpeggiante fra la corteccia, di colore biancastro e coperto da un fitto tomento grigio; le lamelle sono abbastanza spesse, larghe, scorrenti sul gambo, da prima bianche poi grigie; la carne bianca, in età tenace, di odore forte di farina fresca; i basidii clavati; le spore cilindracee, 8-12 3μ .


Nasce cespitoso sui tronchi ancora vivi delle piante a foglia, specialmente del gelso, a tardo autunno, resistendo anche al freddo, donde il nome di Gelone.

È meritamente stimato come fungo mangereccio, ed in alcuni luoghi viene pure coltivato artificialmente; però la carne nel fungo intieramente sviluppato diventa dura, tenace e riesce piuttosto indigesta. Si devono quindi scegliere sempre i cespi giovani o di mezzano sviluppo ed inoltre cuocerli bene. Non si può confondere con specie venefiche.

Spiegazione delle figure: *a* Gruppo di due individui perfettamente sviluppati. *b* Sezione verticale. *c* Spore.



Pleurotus ostreatus Jacq. (Solone);



Hygrophorus pratensis Fr. (*Igroforo pratense*)

Genere *Hygrophorus*.

Funghi carnosio-molli con cappello e gambo, senza anello e volva, ma sovente con velo nel fungo giovane; tessuto del gambo contiguo a quello del cappello; lamelle molli, per lo più scorrenti sul gambo; spore *bianche*, ellittiche, lisce.

HYGROPHORUS PRATENSIS Pers. — Tav. LIX.

Ital. Igroforo pratense. Volg. Fungo della doga, Doga (Veneto). Franc. Agaric ficòide. Ted. Wiesenschwamm.

Ha cappello da convesso spianato-gibboso, quasi a forma di trottola, liscio, secco, di color fulvo o fulvo-ranciato, coll'epidermide di frequente screpolata; lamelle distanti, scorrenti sul gambo, nel fondo congiunte a vene, bianche o con tinta fulva; gambo pieno, nel fungo vecchio sovente cavo, fibrilloso, attenuato inferiormente, del colore del cappello o più pallido; carne pure della medesima tinta ma più languida, di sapore e odore grati; basidii clavati, 45-50 6-7 μ .; spore ellittiche, bianche, 6 4-5 μ .

Si trova nei luoghi erbosi e specialmente nei prati magri di montagna abbastanza copioso in autunno.

È fungo *sapido*, di carne tenera, che merita d'essere conosciuto.

Spiegazione delle figure: *a-c* Fungo in vario grado di sviluppo. *d* Fungo sezionato verticalmente. *e* Basidii. *f* Spore.

HYGROPHORUS VIRGINEUS Wulf. — Tav. LX.

Ital. Fungo Mugnaio. Franc. Le Virginal. Ted. Jungerschwamm.

Ha cappello da convesso o conico-convesso spianato e quasi sempre rilevato nel mezzo, col margine rivolto verso le lamelle e poi nel fungo adulto ripiegato sul cappello, secco, glabro, liscio, ma con pelle screpolato-areolata in età, di colore

bianco, sovente a macchie rosse; lamelle distanti, scorrenti sul gambo, bianche: gambo pieno, poi sovente cavo, glabro, attenuato inferiormente, del color del cappello, talora qua e là o specialmente alla base macchiato di rosso; carne bianca, di sapore grato ed odore fungino; basidii clavati, 50-60 μ : spore bianche, ellittiche, 10-12 μ .

Cresce copioso in autunno nei pascoli e prati magri di montagna in società dell'Igroforo pratense.

Questo fungo, benchè piccolo, può essere raccolto con vantaggio essendo abbondante dove cresce. È migliore dell'Igroforo pratense pel sapore più delicato, che si avvicina a quello del Prugnolo. Non si può confondere con specie venefiche. Somiglia molto all'*Hygrophorus niveus*, che forse è soltanto una varietà dello stesso, e alla *Clitocybe ericetorum*, ma ambedue sono mangerecci, per cui non può riuscire di danno l'eventuale scambio.

Spiegazione delle figure: *a-d* Fungo nei vari gradi di sviluppo. *e* Sezione verticale d'un individuo *f* Basidii. *g* Spore.


Genere **Lactarius**.

Funghi carnosì con cappello e gambo, senza anello e volva; tessuto del gambo contiguo a quello del cappello; lamelle rigide, ceraceo-membranee, *lattiginose*, attaccate al gambo o leggermente scorrenti sullo stesso; carne pure con succo latteo; latte bianco, mite o acre, al contatto dell'aria sovente cangiante di colore; spore bianche o giallognole, globose o quasi globose, con episporio granuloso o aculeolato.


LACTARIUS CONTROVERSUS Pers. — Tav. LXI.

Ital. Peverone o Peveraccio. Volg. Brasca. Sottana (Veneto) France. Le poivrè rose.


Ha cappello assai carnoso, convesso-ombelicato, poi ad imbuto, col margine da prima rivolto verso le lamelle e fio-



Hygrophorus virgineus (Wulf.) Fr. (Fungo Mugnajo)



Lactarius controversus Pers. (Peverone)



Lactarius insulsus Fr. (Pepino strisciato)

{ SOSPETTO }

coso, indì glabro, leggermente viscoso, di color bianco sporco con macchie rosseggianti e talora con zone gialliccie verso il margine, quasi sempre coperto da frustuli di terra; lamelle assai spesse, sottili, strette, attaccate al gambo con seno rientrante, bianche, indì carnicine o giallo-carnicine; gambo corto, solido o raramente in età cavo, biancastro; carne compatta, granulosa, di odore grato, contenente un succo lattiginoso bianco, immutabile all'aria, di sapore acre-piperato; cistidii clavati o quasi fusiformi, 65-75 μ .; basidii clavati, 40-50 μ .; spore ialine, echinulate, quasi rotonde, 6-7 μ .

Vegeta nei boschetti del piano o di mezza montagna in estate ed autunno. Nei dintorni di Trento si trova a Gocciadoro, s. Rocco, s. Antonio, Sopramonte ecc.

È fungo *affatto innocuo*, ma di qualità ordinaria per la carne troppo granulosa e per il latte acre che contiene. Onde renderlo abbastanza buono il miglior mezzo di prepararlo è sulla graticola o in uno stampo di torta con olio, pepe, sale e prezzemolo, oppure, se si vuol usare ad intingolo, col bollirlo un po' nell'acqua, che poi si getta, per indì cuocerlo col metodo indicato al n.° 1 del § sulla cucinatura dei Funghi. Con questa previa bollitura la carne perde il latte e quindi l'acredine e si toglie inoltre il pericolo che mangiandone in quantità riesca drastico, imperocchè quasi tutti i Lattari contengono nel latte un principio che agisce come drastico-purgativo se si mangiano in quantità. Per evitare tale disturbo, basta la previa bollitura che fa depositare nell'acqua il succo lattiginoso.

Spiegazione delle figure: *a* Fungo completamente sviluppato. *b* Sezione verticale d' un individuo. *c* Spore.

LACTARIUS INSULSUS Fr. Tav. LXII.

Ital. Pepino strisciato. Franc. Lactaire rubanné. Ted. Weissmilchender Gift-Reizker.

Ha cappello assai carnoso, convesso-ombelicato, poi ad imbuto, col margine sovente lobato, da prima rivolto verso

le lamelle e pubescente, *viscoso*, di colore giallo-ranciato e a zone igrofane più marcate a tempo umido, a tempo asciutto tutto unicolore; lamelle larghe, non tanto spesse, scorrenti un po' sul gambo, da prima bianche, poi gialliccie con macchie ocracee; gambo pieno, poi cavo, bianco, indi giallastro con fossette di color ocraceo; carne bianca abbastanza compatta con latte bianco, immutabile all'aria, molto acre; basidii clavati, 55-62 μ .; spore quasi rotonde, echinulate, del diametro di 8-10 μ .

Cresce nelle selve conifere di montagna, nei luoghi erbosi, tra i cespugli ecc. nell'estate e autunno.


Viene considerato come *venefico* per il suo latte acerri-
mo, che agisce come vomitorio. È facile confonderlo col Lapacendro buono (Tav. LXIV), con cui cresce sempre insieme, se si osserva soltanto la forma ed il colore del cappello. La nota per distinguerlo con sicurezza è il latte, che nel Lapacendro è colore ranciato e nel Peperino strisciato è sempre bianco.

Spiegazione delle figure: *a-b* Fungo in vario grado di sviluppo. *c* Fungo sezionato verticalmente. *d* Basidii. *e* Spore.

LACTARIUS AURANTIACUS Pers. Syn. p. 432. (*Lactarius Porcinæ* Roll.) Tav. LXIII.

Ital. Lattario ranciato. Volg. Fong del Lares. Franc. Lactaire orangé.

Ha cappello da convesso piano-depresso o ciatiforme, coi margini da prima rivolti verso le lamelle e bianco-pruinati, viscoso a tempo umido, di colore ranciato vivo con macchie o zone igrofane di color più marcato, che dispariscono nel fungo secco o asciutto; lamelle spesse, un po' scorrenti sul gambo e attenuate o più sovente un po' rotondate al punto d'inserzione, da prima bianche, poi color ocraceo-ranciato; gambo subito cavo, cilindrico, da giovane pruinato, del color




Lactarius aurantiacus Fl. D. (Lattario ranciato)

(SOSPETTO)

Bresadola dis.

Lit. G. Zippel Torino



Lactarius deliciosus (Linn.) Fr. (Baracendre buono)

del cappello, ma più languido; carne bianca, vicino all'epidermide giallo-ranciata, di forte odore; latte bianco, immutabile, *molto acre*, spore quasi rotonde, echinulate, 7-8 μ .

Si trova assai frequente in greggi nei luoghi erbosi, pascoli, nelle selve rade di larice in montagna dal luglio al novembre.

È fungo *pericolosissimo* mangiandone in quantità producendo diarree, vomiti e mal di capo; inoltre riesce d'un gusto sgradevole, quantunque venga anticipatamente bollito nell'acqua e poi ben preparato. Si confonde facilmente col Lapacendro buono, pel quale anzi lo vidi raccogliere parecchie volte; e vengono certamente causati da questo fungo gli avvelenamenti o i disturbi che talora si attribuiscono al primo. Convien quindi star attenti per non scambiarlo, il che riuscirà facile se si osserva che al taglio nel Lattario ranciato la carne ed il latte sono bianchi, mentre nel Lapacendro sono colore arancio.

Spiegazione delle figure: *a-c* Fungo in vario grado di sviluppo. *d* Individuo sezionato verticalmente. *e* Spore.

LACTARIUS DELICIOSUS Lim. Tav. LXIV.

Ital. Lapacendro buono. Volg. Fong dal Pin. Sanguignol. Franc. Le sanguin. Ted. Reissger, Brütling.

Ha cappello da convesso-ombelicato depresso o quasi imbutiforme, coi margini da prima rivolti verso le lamelle e pubescenti, un po' viscoso, di color rosso-ranciato più o meno vivo a seconda dell'età, sovente con zone più marcate, nel fungo adulto a macchie color verde-rame; lamelle spesse, strette, color ranciato-languido, con macchie verdi in età; gambo subito cavo, cilindrico, del color del cappello, con piccole fossette ovali o rotonde a tinta più marcata ed in età pure a chiazze verdi; carne granulosa, bianco-gialla e alla periferia colore ranciato, di buon odore; latte copioso, colore ranciato vivo, di sapore piperato che tramanda alla

carne: basidii clavati, 40-45 9-10 μ .; spore quasi rotonde, echinulate, 10 8 μ .

Si trova in tutte le selve, specialmente ai margini erbosi sotto le piante conifere, dal luglio al novembre.

Il Lapacendro buono è uno dei funghi *più sicuri* e più in uso che si conoscano. Già i Romani ne apprezzarono le proprietà mangerecce. Plinio nella sua storia naturale lo mette a paro dell'Uovolo, e negli affreschi scoperti a Pompei si trova pure la figura di questo fungo. I metodi usati per prepararlo sono alla graticola e al tegame. Onde riesca saporito conviene scegliere individui giovani e ben conservati. Nel fungo adulto la carne diventa grumosa e perde molto del primitivo sapore.

Spiegazione delle figure: *a-d* Fungo in vario grado di sviluppo. *e* Fungo sezionato verticalmente. *f* Basidii. *g* Spore.


LACTARIUS SANGUIFLOUS. Paul. Tav. LXV.

Ital. Lapacendro sanguigno. Volg. Fong dal sangue, Sanguignol. Franc. Lactaire à suc rouge.

Ha cappello da convesso-ombelicato spianato-depresso o quasi imbutiforme, col margine da prima rivolto verso le lamelle e bianco-pruinato, viscoso, di color ranciato-vinoso, poi ranciato-aurereo con macchie verde-rame, a zone più marcate che spariscono con l'età; lamelle spesse, sottili verso il gambo, attaccate e leggermente scorrenti sullo stesso, di color roseo, carnicino o violaceo-livido, volgenti al ranciato nel fungo adulto e macchiate di verde; gambo pieno o raramente cavo, attenuato verso la base, rosso-sanguigno o roseo, poi del colore del cappello, da prima coperto d'una pruina bianca, sovente a fossette con tinta più forte e colle medesime macchie verde-rame del cappello e delle lamelle, prodotte dal latte che al contatto dell'aria cangia di colore; carne bianca, al taglio macchiata di rosso, d'odore grato da frutta e sapore acre-piperato; latte di colore sanguigno, pi-



Lactarius sanguifluus Paul. (*Laparendro sanguigno*)



Lactarius volomus Fr. (Peveraccio giallo)

perato; basidii clavati, 35-40 8-10 μ .; spore quasi rotonde, echinulate, 8-10 8-9 μ .

Nasce nei pineti della zona della vite in famiglie numerose dall'agosto al novembre.

Il Lapacendro sanguigno ha le *medesime proprietà* e serve ai medesimi usi del Lapacendro buono, col quale generalmente si confonde, specialmente quando è inferiormente sviluppato e perde i bei colori giovanili; però il latte di color sangue lo conserva, e da questo carattere può essere sempre distinto. Non cresce in montagna, nè nelle selve di conifere, ma esclusivamente nei boschetti di *Pino* nelle valli vitifere. Non si trova quindi in Val di Sole, in Val di Fiemme, Val di Rendena ecc. dov' è surrogato dal Lapacendro buono, il quale vegeta fin quasi al termine della vegetazione arborea.

È di gusto più delicato del Lapacendro buono e viene generalmente preferito a questo nei luoghi dove cresce in società.

Spiegazione delle figure: *a-d* Fungo in vario grado di sviluppo. *e* Individuo sezionato verticalmente. *f* Basidii. *g* Spore.

LACTARIUS VOLEMUS Fr. Tav. LXVI.

Ital. Peveraccio giallo. Franc. La vachette. Ted. Brätling.

Ha cappello da prima globoso poi spianato-depresso, con margine da prima rivolto verso le lamelle e bianco pubescente, secco, di colore giallo aranciato o giallo fulvo tendente al bruno nel centro, tutto screpolato in età; lamelle spesse, da prima bianche poi giallognole, attenuate alle due estremità, un po' decorrenti sul gambo; gambo solido, cilindrico, duro, del colore del cappello o un po' più languido; carne compatta, dura, bianca, al taglio bruna, di sapore dolce e odore grato; latte copiosissimo, bianco, immutabile,

di sapore dolce; spore bianche, rotonde, echinulate, 8-9 μ , di diametro.

Vegeta copioso tanto nelle selve di conifere che di piante frondose dal luglio all'ottobre, specialmente nei luoghi muscosi.

È fungo *assolutamente innocuo* e di buon gusto se viene ben cotto e condito.

Da noi non è conosciuto, ma in altri luoghi, specialmente nell'Austria inferiore, è ricercato a preferenza del Lappacendro buono. Colà si prepara dal popolo alla graticola facendo un taglio longitudinale al gambo e cospergendolo con molto sale, e dalle classi agiate alla casseruola con burro, brodo di carne, pepe, sale, prezzemolo e quando è presto cotto aggiungendovi del semolino (gries) quanto è necessario ad assorbire l'ingolo, e poi a piena cottura si serve come contorno alla carne.

Spiegazione delle figure: *a-b* Individuo in vario grado di sviluppo. *c* Individuo sezionato verticalmente. *d* Spore.


LACTARIUS VELLEREUS Fr. Tav. LXVII.

Ital. Lattario lanuto. Franc. Le poivré moutonné Ted. Wollschwamm.

Ha cappello convesso-ombelicato, poi ad imbuto, assai carnoso, compatto, tutto coperto da una fina lanugine di colore bianco-calce; lamelle grosse, distanti, sovente ramosi, al gambo troncato-attaccate, bianche; gambo corto, obeso, bianco, pubescente; carne compatta, granulosa, acre; latte bianco, acre-piperato, diventante al contatto dell'aria, dopo qualche tempo, color zoffino; basidii clavati, 40-50 7-10. μ ; spore bianche, quasi rotonde, 6-8 - 6 μ , minutamente asperule.

Cresce copioso in greggi nelle selve di conifere dal luglio all'ottobre.

Di questo fungo ho dato la figura perchè si distingua



Lactarius vellereus Fr. (Lactario lanule)
[SUSPETTO]





Russula delica Fr. (*Russula ocrea* L.)

dalla Rossola delicata, che è mangereccia, e colla quale ha moltissima somiglianza. Pel suo latte riesce assai drastico e, se mangiato in quantità, agisce come vomitorio; perde però queste proprietà se viene prima bollito nell'acqua e poi, gettandola via, cucinato. In vari luoghi si usa prepararlo per l'inverno in salamoia cuocendolo quasi intieramente nell'acqua, e poi spremuto polverizzandolo con sale e collocandolo in vasi di terra ponendovi sopra un peso per tenerlo ben compresso. Quando si vuol mangiarlo, se lo prende fuori e si cuoce alla graticola nel modo già altrove accennato. Trattandolo così riesce innocuo, ma non però buono.

Spiegazione delle figure: *a* Fungo bene sviluppato. *b* Fungo sezionato verticalmente. *c* Basidii. *d* Spore.

Genere *Russula*.

Funghi carnosì con cappello e gambo, senza anello e volva, tessuto del gambo contiguo a quello del cappello; lamelle rigide, fragili, senza succo latteo, al gambo per lo più libere o soltanto aderenti; carne granulosa; spore bianche o giallognole, globose o quasi globose con episporio echinulato.

RUSSULA DELICA Fr. Tav. LXVIII.

Ital. Rossola delicata, Colombina bianca. Franc. Prévot.

Ha cappello convesso-depresso e poi quasi imbutiforme, coi margini da prima rivolti verso le lamelle, di colore bianco sporeo, con tinta qua e là nocciuola, quasi sempre coperto dalla terra o dagli aghi delle conifere che smuove crescendo; lamelle abbastanza spesse, sovente forcate, un po' decorrenti sul gambo, bianche, a riflesso glauco o verde-rame languidissimo; gambo eguale, cilindrico, glabro, bianco, sovente alla sommità con zona colore celestino o verde rame; carne granulosa, di odore non tanto marcato e di sapore un po' piccante nel fungo giovane; basidii clavati, 50-55 × 12-15 μ .; spore bianche, rotonde, echinulate, 9-12 × 9-11 μ .

È comune dovunque nelle selve tanto di conifere che di piante frondose dal giugno all'ottobre in famiglie di molti individui disposti per lo più in circoli.

È fungo *mangereccio*, ma non della migliore qualità a motivo della carne troppo grossolana e dura. Convieni perciò cuocerlo molto bene e ben condirlo, affinchè riesca gradevole. È facile confonderlo col Lattario lanuto, dal quale però diversifica specialmente per la mancanza di latte, pel colore meno bianco e per la carne meno acra.

Spiegazione delle figure: *a-b* Due individui in posizione diversa. *c* Individuo sezionato verticalmente. *d* Basidii e cistidii. *e* Spore.

RUSSULA VIRESCENS Schaeff. — Tav. LXIX.


Ital. Verdone, Colombina verde, macchiata. Franc. Palomet. Ted. Grünlicher Täubling.

Ha cappello carnoso, da prima quasi globoso, poi piano e depresso nel centro, secco, colla superficie subito screpolata in areole poligonali, di colore verde rame o glauco-azzurrognolo o anche giallo-verde su fondo paglierino; lamelle strette, eguali, spesse, bianche, fragili, al gambo attenuato-libere; gambo eguale, rugoso-striato, pieno d'una sostanza spugnosa, poi a cavità, bianco; carne compatta, un po' granulosa, bianca, al taglio diventante di tinta ontano-pallida, di grato odore e sapore; basidii clavati, 36-40 9-10 μ .; spore bianche, quasi rotonde, echinulate, 7-9 7-7 $\frac{1}{2}$ μ .


Nasce nei boschi a foglia o misti dal luglio all'ottobre in famiglie.

È uno dei funghi *più squisiti*, e si può preparare tanto alla graticola che al tegame. Non è facile confonderlo con altre specie se si osserva alle screpolature del cappello, che non si verificano mai sotto questo aspetto in altre Rossole.

Spiegazione delle figure: *a-b* Fungo in vario grado di sviluppo. *c* Individuo sezionato verticalmente. *d* Basidii e cistidii. *e* Spore.



Russula virescens Schaeff. (Verdone)



Russula lepida Fr. (*Rossola lepida*)



RUSSULA LEPIDA Fr. — Tav. LXX.

Ital. Rossola lepida, Colombina rossa di sapore dolce. Franc. Rougillon pourpre. Ted. Rosen-Täubling.

Ha cappello carnoso, compatto, da convesso spianato-depresso, secco, di colore roseo-sanguigno o rosso-aranciato, col centro in età biancheggiante e coll'epidermide screpolata in areole o squame; lamelle abbastanza spesse, grosse, qua e là forcate, al gambo rotondate, bianche, poi giallognole, verso il margine del cappello talora col taglio rosso; gambo robusto, solido, liscio o un po' rugoso, bianco, tinto in parte di roseo; carne bianca, *mite*, compatto-granulosa, di sapore grato di nocciuola e odore non marcato; cistidii fusiformi, 70-80 9-11 μ .; basidii 35-40 8-10 μ .; spore bianche, echinulate, rotondate, 7-9 μ .

Cresce nei boschetti frondosi delle valli dal luglio all'ottobre in greggi.

Ha le *medesime proprietà* e il medesimo gusto del Verdone, e perciò merita d'essere conosciuta ed apprezzata. Osservandola solamente al colore, si può confonderla con altre specie di Rossola venefiche o sospette, come la Russola emetica (Tav. LXXIII), Russula rubra, Russula sanguinea ecc.; ma, oltre i caratteri specifici quivi indicati, una nota pratica sicura per distinguere questa specie, come pure tutte le Rossole mangerecce dalle Rossole venefiche o sospette, si è il sapore della carne, il quale nelle prime è dolce, mite, caseoso, e nelle seconde è acre e piperrato. Basta quindi, nel dubbio che un esemplare di Rossola sia o no venefico o sospetto, assaggiarne la carne: se questa è mite si può senza nessun pericolo mangiarne, se è acre si deve rifiutare. Nè tale assaggio riesce di danno stante la tenuità della materia e poi perchè appena assaggiata si può tosto rigettare.

Spiegazione delle figure: *a-b* Fungo in vario grado di sviluppo. *c* Sezione verticale d'un individuo. *d* Basidii e cistidii. *e* Spore.

RUSSULA CYANOXANTHA Schaeff. Tav. LXXI.

Ital. Rossola iridescente, Rossola maggiore, Colombina maggiore. Franc. Charbonnier. Ted. Graublauer Täubling.

Ha cappello carnoso, compatto, da prima ovale, poi spianato-depresso, glabro, striato, a tempo umido viscoso, di vario colore, bruno-ceruleo, con centro giallastro, lilacino-violaceo, violaceo-porporino, grigio ardesia o piombino, con tinta qua e là lilacino-cianea a seconda dell'età o del tempo umido o secco; lamelle spesse, larghe, fragili, sovente forcate e con lamellette, al gambo attenuato-attaccate, bianche; gambo robusto, verso la base per lo più attenuato, bianco o con tratti a tinta lilacino-violacea o anche tutto lilacino, pieno, poi lacunoso; carne compatto-granulosa, bianca, sotto l'epidermide lilacino-violacea, di sapore *mite* e odore non marcato; basidii clavati, spore quasi rotonde, bianche, 7-9 μ \times 7-8 μ , echinulate.

Vegeta per lo più nelle selve conifere di montagna in famiglie dal giugno all'ottobre.

Anche questa Rossola è *squisita* e del medesimo gusto del Verdone e della Rossola lepida. Non è facile confonderla con altre se si osserva la sua robustezza; pei colori si avvicina molto alla Rossola grigia (Tav. LXXVII), che è più fragile e con lamelle colorate, ma anche questa è mangereccia, per cui nessun danno ne deriverebbe dallo scambio.

Spiegazione delle figure: *a-b* Fungo in vario grado di sviluppo. *c* Individuo sezionato verticalmente. *d* Parte dell'imenio per vedere la disposizione delle lamelle. *e* Basidii e cistidii. *f* Spore.


RUSSULA VESCA Fr. Tav. LXXII.

Ital. Rossola edule. Volg. Panarola fumola (Veneto). Franc. Rougillon comestible. Ted. Essbarer Täubling.


Ha cappello carnoso, da convesso spianato-depresso,



Russula cyanoxantha Schaelf. | *Rossola maggiore* |



Russula vesca Fr. *Rossola edule* L.



Russula emetica Fr. (Rossetto)
(VELENOSO)

glabro, a tempo umido un po' viscoso, presto secco, di colore bruno-carnicino, più languido nel centro, che assume coll'età una tinta giallo-lurida; lamelle spesse, strette, nel fungo giovane verso il piede rotondato-attaccate, poi un po' decorrenti, bianche, a tempo umido ploranti, indi a macchie gialliccie, prodotte dal disseccamento delle gocce; gambo solido, un po' ventricoso, rugosetto, bianco, con tinta a tratti carnicina ed alla base ocracea; carne bianca, *mile*, compatta, granulosa, di nessun odore e sapore speciale; cistidii fusoidi, $65-8\ \mu$.; basidii clavati, $40-50-7-8\ \mu$.; spore rotonde, bianche, echinulate, $7-8-7\ \mu$.

Vegeta copiosa nelle selve di conifere dal luglio all'ottobre.

Per la consistenza e compattezza della carne è molto affine alla *Rossola iridescente*, della quale ha pure il gusto e le *qualità nutritive*. Non è facile confonderla con altre specie.

Spiegazione delle figure: *a-b* Fungo in vario grado di sviluppo. *c* Individuo sezionato verticalmente. *d* Pezzetto d'imenio per vedere la disposizione delle lamelle. *e* Basidii e cistidii. *f* Spore.

RUSSULA EMETICA Fr. — Tav. LXXIII.

Ital. Rossetta, Colombina rossa. Volg. Panaròla rossa (Veneto). Franc. L'Émétique. Ted. Speitäubling.

Ha cappello da convesso spianato-depresso, viscoso, glabro, color roseo, roseo-sanguigno, qua e là biancheggiante o anche a chiazze gialle, col margine in età solcato; lamelle un po' distanti, eguali, al piede rotondato-libere, bianche, poi paglierine; gambo solido, duro, indi molle, rugosetto, bianco o con tinta del colore del cappello; carne bianca, sotto l'epidermide rosea, *acerrima*; cistidii fusoidi, $50-60-8-10\ \mu$.; basidii clavati, $35-40-8-10\ \mu$.; spore quasi rotonde, echinulate, bianche, $8-10-8\ \mu$.

Cresce a preferenza nei boschi frondosi, ai margini erbosi, dal luglio all'ottobre.

Questo fungo si considera *venefico* e si citano dagli autori dei casi di avvelenamento. Quanto per mia propria esperienza posso dire si è che in dosi piccole è certamente innocuo, ma, per la carne molto aere e amara, riesce un cibo poco gustevole. Anche se preparato in unione ad altri funghi mangerecci di buon gusto li rende molto meno gradevoli.

Spiegazione delle figure: *a-b* Fungo in vario grado di sviluppo. *c* Fungo sezionato verticalmente. *d* Basidii e cistidii. *e* Spore.


RUSSULA INTEGRALIMI. Tav. LXXIV.

Ital. Rossola buona. Franc. Rougillon bâtard. Ted. Rother Täubling.

Ha cappello carnoso, convesso, poi spianato-depresso, leggermente viscoso a tempo umido, colore rosso-porpora, con centro più languido o talvolta bianco-giallognolo, al margine da prima liscio, poi solcato-tubereoloso; lamelle abbastanza spesse, molto larghe, nel fondo congiunte a vene, al gambo rotondato-aderenti e bifide, nel fungo giovane bianche, poi tosto con tinta giallo-alutacea; gambo quasi eguale o attenuato alla base, striato-rugosetto, pieno, poi lacunoso, bianco; carne bianca, *mite*, di sapore grato, quasi di cacio e odore non marcato; cistidii rari, fusoidei, 60-9 μ .; basidii clavato-subventricosi, 45-50-9-12 μ .; spore quasi rotonde, echinulate, gialliccie, 7-9-7-8 μ .


Cresce a preferenza nei querceti e boschi di alberi frondosi al basso delle valli, già dalla fine di maggio o dai primi di giugno in famiglie.

È una delle Rossole *migliori* pel gusto e per la carne tenera, presto cotta. È facile confonderla colla Rossola languente (Tav. LXXV) che è indicata venefica. Per poterla con sicurezza distinguere conviene osservare il gusto della carne, che nella Rossola buona è *mite*, mentre nella



Russula integra Fr. (Rossole buona)






Russula veteriosa Fr. (*Fossola languente*)

(SOSPETTO)





Russula alutacea Fr. (*Russula alutacea*)



Rossola languente è *molto acra*. Inoltre quest'ultima Rossola si trova per lo più soltanto in autunno e nelle selve di conifere.

Spiegazione delle figure: *a-b* Fungo in vario grado di sviluppo. *c* Fungo sezionato verticalmente. *d* Basidii e cistidii. *e* Spore.

RUSSULA VETERNOSA Fr. — Tav. LXXV.

Ital. Rossola languente. Franc. Rougillon languissant.

Ha cappello carnoso, da convesso spianato-depresso, a tempo umido un po' viscoso, di colore roseo carneo o carnicino, presto impallidente al centro, che resta biancastro o giallo-paglia, col margine nel fungo adulto solcato-tuberculato; lamelle spesse, al gambo rotondato-aderenti o libere, fragili, da prima bianche, poi giallastro-isabelline; gambo spongioso-pieno, poi lacinoso, rugosetto, eguale o un po' dilatato all'apice, per lo più bianco o con tinta rosea verso la base; carne bianca, caseoso-spongiosa, *acerrima*; cistidii fusoidi, 60-80 e 7-10 μ .; basidii clavato-capitati, 35-40 10-12 μ .; spore gialle, echinulate, quasi rotonde, 8-10 8-9 μ .

Vegeta nelle selve di conifere di montagna dalla fine di agosto all'ottobre.

Questa Rossola è considerata *venefica* dagli autori forse più per il sapore acra della sua carne che per fatti constatati di avvelenamento. Da noi è molto rara, ed io la trovai sempre in pochissima quantità. Dall'aspetto esterno sembra affatto eguale alla Rossola buona, dalla quale però si può subito distinguere per l'acredine.

Spiegazione delle figure: *a-b* Fungo in vario grado di sviluppo. *c* Fungo sezionato verticalmente. *d* Basidii e cistidii. *e* Spore.

RUSSULA ALUTACEA Fr. — Tav. LXXVI.

Ital. Rossola alutacea. Volg. Colombina rossa e gialla. Franc. Rougillon. Ted. Ledergelber Täubling.

Ha cappello da convesso piano-depresso, carnoso, a tempo umido viscoso, col margine in età appena solcato-tuberoso, di colore fosco-porpora o rosso, con centro quasi nero o anche pallido e a chiazze giallastre; lamelle spesse, grossette, nel fondo congiunte a vene, eguali, al piede sinuato-aderenti o rotondato-libere, da bianche ocracee; gambo robusto, rugosetto, bianco o qua e là tinto di rosso o anche tutto rosso, pieno d'una sostanza in età spongiosa; carne bianca, grumosa, al taglio diventante paglierina sotto l'epidermide, *mite*; cistidii fusoidi, 70-80 9-10 μ .; basidii clavati, ventricosi, 45-50 11-13 μ .; spore quasi rotonde, gialle, echinulate, 10-11 9-10 μ .

Si trova a preferenza nei boschi di quercia dall'agosto al novembre.


È fungo di *ottima qualità*, a carne più compatta di quella della Rossola buona, alla quale molto somiglia.

Spiegazione delle figure: *a-b* Fungo in vario grado di sviluppo. *c* Sezione verticale d'un individuo. *d* Basidii, cistidii. *e* Tessuto sottoposto. *f* Spore.

RUSSULA GRISEA Pers. Tav. LXXVII.

Ital. Rossola grigia. Franc. Rougillon gris. Ted. Grauer Täubling.

Ha cappello da convesso piano-depresso, glabro, a tempo umido viscoso, col margine tenue, da vecchio un po' striato-solcato, di colore molto vario nel medesimo individuo, lilacino, celestino, grigiastro, olivaceo, glauco-cesio, talora nel primo sviluppo quasi bianco, poi va colorandosi, e nel fungo vecchio presenta una tinta uniforme grigio-acciaio con qualche sfumatura di giallo-sporeo o olivaceo; lamelle spesse, eguali, sottili, al gambo attenuato-attaccate, bianche, poi nel fungo sviluppato color cera vergine; gambo pieno, lacunoso, un po' ventricoso, duro, rugosetto, bianco; carne bianca, *mite*, sapida; cistidii fusoidi, 50-65 10-12;



Russula grisea Pers. (Rossola grigia)





Russula aurata Fr. (Rossola dorata)



basidii clavati, 30-35 \times 7-8 μ .; spore quasi rotonde, echinulate, ocreoleuche, 7-8 \times 6-7 μ .

Si trova molto frequente tanto nelle selve di conifere che nei boschi a foglia dal luglio all'ottobre.

È una delle *Rossole più gustevoli*. Ha carne tenera, di sapore dolce, da cacio, ed è subito cotta. Non si può confondere con *Rossole acri*. Pei colori si avvicina alla *Rossola maggiore*, pure mangereccia, ma è di statura minore, più gracile e fragile in tutte le sue parti.

Spiegazione delle figure: *a-c* Fungo in vario grado di sviluppo. *d* Fungo sezionato verticalmente. *e* Basidii. *f* Spore.

RUSSULA AURATA Fr. — Tav. LXXVIII.

Ital. *Rossola dorata*. Franc. *Rougillon doré*. Ted. *Goldfarbener Täubling*.

Ha cappello da convesso piano-depresso, glabro, a tempo umido viscoso, col margine nel fungo sviluppato solcato-tuberculoso, di colore giallo-ovovo o dorato, con tinta qua e là rossa o porporina, raramente tutto unicolore giallo, nel centro talora anche bruno-porpora; lamelle spesse, eguali, al piede rotondato-libere, da bianco-gialle, col taglio giallo-ovovo; gambo quasi eguale o ventricoso, bianco o con tinta gialla, rugosetto, pieno, poi cavo o lacunoso; carne bianca, sotto l'epidermide di color citrino, *mite*; cistidii fusoidi, 55-60 \times 9-12 μ .; basidii clavati, ventricosi, 45-50 \times 13-15 μ .; spore quasi rotonde, gialle, echinulate, 10 \times 8-9 μ .

Crece a preferenza nelle selve di *Abete bianco* in greggi numerose in luglio ed agosto; nell'autunno è rara.

È forse la *migliore specie* di *Rossola*. Ha carne tenera delicata, di squisito sapore e subito cotta. Anche pei caratteri distintivi speciali è difficile confonderla con altre; merita quindi d'essere ben conosciuta.

Spiegazione delle figure: *a-c* Fungo in vario grado

di sviluppo. *d* Fungo sezionato verticalmente. *e* Basidii. *f* Spore.

RUSSULA LUTEA FR. — Tav. LXXIX.

Ital. Rossola gialla. Franc. Rougillon jaune. Ted. Gelber Täubling.

Ha cappello poco carnoso, da convesso piano-depresso, a tempo umido viscoso, col margine soltanto negli individui vecchi solcato quantunque tenue, d'un bel colore uniforme in tutta la superficie giallo-uovo; lamelle spesse, attenuato-libere al gambo, eguali, fragili, da prima bianche, poi giallo-isabelline, nel fondo congiunte a vene; gambo per lo più un po' ventricoso, bianco, vuoto, molle, fragile, rugosetto-reticolato; carne bianca, *mile*; cistidii rari, fusoidi, 60-70 μ .; basidii clavati, 35-40 μ .; spore gialle, quasi rotonde, echinulate, 8-9 μ .; 7-7 μ .


Si trova gregaria tanto nelle selve conifere che frondose, però sempre in poca quantità, dal luglio all'ottobre.

È specie *mangereccia* molto delicata, gustosissima e per la carne tenera subito cotta. Anche questa specie, come la Rossola dorata, offre caratteri speciali da non potersi confondere con altre, per cui la raccolta non può essere pericolosa.

Spiegazione delle figure: *a-c* Fungo in vario grado di sviluppo. *d* Fungo sezionato verticalmente. *e* Basidii e cistidii. *f* Spore.


Genere *Cantharellus*.

Funghi carnosi con cappello e gambo o cappello soltanto, senza anello e volva; tessuto del gambo contiguo a quello del cappello; lamelle grosse, carnosocereacee, veniformi, ramosose e reticolate, col taglio ottuso, scorrenti sul gambo; spore bianche o paglierine, ellittiche, ovate o ovato-allungate; basidii a 4-8 sterimmi.



Russula lutea Fr. (Rossola gialla)





Cantharellus cibarius Fr. (Gallinaccio)



CANTHARELLUS CIBARIUS Fr. Tav. LXXX.

Ital. Gallinaccio, Capo gallo. Volg. Fiuferlo, Galetto, Zaldì (Lombardia). Franc. Chanterelle. Ted. Pfifferling.

Ha cappello carnoso, convesso, poi depresso-concavo, finalmente ad imbuto, coi margini irregolari, lobati, sinuato-ondulati, crespi ecc., secco, glabro, o da giovane appena pubescente, di colore giallo-dorato o giallo-ranciato più o meno vivo, raramente bianco con tinta ai margini canarino o lilacino-carnea; lamelle assai decorrenti sul gambo, da prima a forma di vene, poi rialzate, ma sempre ottuse al taglio, reticolate, ripetutamente foreate, del colore del cappello; gambo solido, per lo più attenuato alla base, glabro, pure del medesimo colore; carne bianca, ai lati gialla, fibrosa, di buon sapore ed odore; basidii 60-100 7-11 μ .; spore color paglia, ellittiche, 8-12 \times 4 $\frac{1}{2}$ -7 μ .

È comunissimo in tutte le selve dal giugno all'ottobre in grandi famiglie, per lo più disposto in circoli o macchie.

Il Gallinaccio è fungo *mangereccio* sommamente apprezzato, ed è raccolto e mangiato dovunque. Offre un cibo oltrechè gustoso, anche molto nutriente, essendo constatato che contiene il 24 % di sostanze azotate ed il 9 % di sali nutritivi. Benchè di assoluta innocenza conviene però raccogliere individui sani, non troppo sviluppati, giacchè nel fungo vecchio la carne diventa molle, perde le proprietà nutritive ed assume un odore forte, nauseante.

Non si può confondere con qualità venefiche. La specie che gli è molto somigliante e che anzi sembrerebbe una varietà piccola è il *Cantharellus Quèletii* Fr., ma anche questo, del resto rarissimo, è mangereccio. Il *Cantharellus aurantiacus* Wulf. poi è affatto diverso, nè si può commutare col Gallinaccio, e chi asserisce il contrario non deve certamente conoscerlo.

Spiegazione delle figure: *a-d* Fungo in vario grado di sviluppo. *e* Fungo sezionato verticalmente. *f* Basidii. *g* Spore.

CANTHARELLUS LUTESCENS Pers. (*Craterellus* Aut.) —
Tav. LXXXI.

Ital. Cantarello giallo, Volg. Finferla. Franc. Chanterelle jaunâtre. Ted. Gelblicher Faltenschwamm.

Ha cappello membranaceo, da convesso-ombelicato espanso-imbutiforme, chiuso o aperto e comunicante colla cavità del gambo, a margine irregolare, ondulato-repando e lobato, fioccoso-squamosetto e in età glabrescente, colore fosco-ombrioso impallidente; imenio di color giallo, cangiante in rosso-aurereo o roseo-cesio, da prima liscio, poi coperto da vene turgide, dicotomo-ramose; gambo compresso o canaliculato, nella parte inferiore ingrossato, cavo, di colore arancio vivo; carne tenace, di color giallo, di odore forte, un po' nauseante e di sapore non marcato; basidii clavati, 70-100 μ ; spore giallognole, ovate, 10-12 μ .

Cresce tanto nelle selve conifere che a foglia in famiglie o a cespugli, dall' agosto al novembre, e preferisce le località umide.


È fungo *mangericcio* di conosciuta innocenza, ma molto inferiore al Gallinaccio per la carne più tenace e meno saporita. Per la manifesta affinità e per la sua gracilità in confronto dell' antecedente, il volgo lo distingue col nome femminile di *Finferla*.

Spiegazione delle figure: *a* Gruppo di funghi. *b* Sezione verticale d' un individuo. *c* Basidii. *d* Spore.

CANTHARELLUS CLAVATUS Pers. — Tav. LXXXII.


Ital. Cantarello violaceo. Franc. Chanterelle pourpre. Ted. Hasenöhrl.

Ha forma assai variabile; da prima si presenta come una clava troncata all' apice, poi si dilata e prende l' aspetto di trottolo o di ventaglio coi margini per lo più lobati. La parte superiore che rappresenta il cappello è nel fungo giovane color violaceo, poi passa al colore olivastro; la parte



Cantharellus lutescens (Pers.) Fr. (Cantarello giallo)





Cantharellus clavatus Fr. (Cantarello violaceo)





Craterellus cornucopioides Pers. (Trombetta da morto)



laterale o imeniale è di colore viola-carnieino, da prima liscia, indi percorsa da vene turgide, ramosse e reticolate; il gambo è breve, obeso, si unisce alla parte imeniale senza segno di distinzione, e ne ha il medesimo colore. La carne è bianca, di sapore un po' acidulo nel fungo adulto. Le spore sono gialliccie, a forma di mandorla, allungate, 10-13 . 4-5 *a*.

Cresce per lo più a cespi e in lunghe file nelle selve di conifere in montagna dall'agosto all'ottobre.

Il Cantarello violaceo è specie *mangereccia* di buon gusto, purchè si scelgano esemplari giovani; il fungo adulto diventa troppo acido e perciò si deve rigettare. Per la sua forma singolare e pei colori che lo distinguono non si può confondere con altra specie.

Spiegazione delle figure: *a* Gruppo di funghi. *b* Individuo isolato a forma di ventaglio. *c* Individuo sezionato verticalmente. *d* Spore.

Genere *Craterellus*.

Funghi carnosio-membranacei, con cappello e gambo, senza anello e volva; tessuto del gambo contiguo a quello del cappello; cappello aperto nel gambo; imenio liscio, senza lamelle o vene, ma talora con qualche rugosità; spore *bianche*, ellittiche; basidii a due sterimmi.

CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES Pers. Tav. LXXXIII.

Ital. Trombetta da morto. Franc. Trompette des morts. Ted. Todtentrompete.

Ha cappello carnosio-membranaceo, aperto nel gambo a forma di imbuto, coi margini convessi, lobati e ondulato-sinuosi, di colore fuligginoso, con piccole squamette di tinta più carica; imenio o parte inferiore del cappello liscia e con qualche ruga in età, di colore cenere-fuligginoso; gambo cavo, glabro, con lacune longitudinali, attenuato verso la base; carne concolore, di odore un po' marcato nel fungo adulto;

basidii cilindraceo-clavati, all'apice forcati (bisterimmi), 65-75 μ 8-9 μ .; spore ellittiche, 10-15 μ 7-9 μ .

Vegeta a preferenza nei luoghi umidi tanto nelle selve di conifere che di alberi a foglia dall'agosto al novembre.

La Trombetta da morto ha quasi il *medesimo gusto*, la medesima consistenza della carne ed il medesimo odore, quando è bene sviluppato, del Cantarello giallo, e perciò merita d'esserè preso in considerazione quantunque il colore triste, che gli fece aggiungere al suo nome l'appellativo *da morto*, non ne lusinghi troppo la raccolta. Non si può confondere con specie venefiche.

Spiegazione delle figure: *a-c* Fungo in vario grado di sviluppo, *d* Fungo sezionato verticalmente, *e* Basidii e ife, *f* Spore.

Genere **Marasmius.**

Funghi aridi, carnosio-tenaci, membranaceo-cartilaginosi, con cappello e gambo, senza anello e volva; tessuto del gambo contiguo a quello del cappello; lamelle tenaci, al gambo libere, sinuate o aderenti; spore *bianche*, ovate o ovato-allungate, lisce.

MARASMIUS OREADES Bolt. Tav. LXXXIV.


Ital. Fungo color d'Isabella, Oreade. Volg. Gambe secche. Franc. Faux mousseron. Ted. Herbstmousseron.

Ha cappello carnosio-tenace, da convesso-campanulato spianato e umbonato, col margine in età striato, glabro, a tempo umido un po' lubrico, di colore isabella carico, poi invecchiando nocciuola o alutaceo o anche biancastro; lamelle distanti, al gambo rotondato-libere, nel fondo congiunte a vene, di colore bianco-acquoso, poi quasi del color del cappello; gambo pieno, quasi eguale o appena ingrossato alla base, tomentosetto, di tessuto fibroso, da prima bianco poi con tinta nocciuola; carne bianca, in età tenace, di buon



Marasmius oreades Bolt. (Fungo color d'Isabella)





Volvaria speciosa Fr. (*Volvaria bianca*)

VELENOSO



sapore e odore; basidii clavati, 45-60 \times 5-6 μ .; spore bianche, obovate, 8-10 \times 5-6 μ .

Vegeta nei luoghi erbosi selvatici, al margine delle strade, nei pascoli ecc. in lunghe file dall'aprile al novembre.

L'Oreade va annoverato fra le specie *mangerecce* più gustevoli, approssimandosi per l'aroma al Prugnolo. Però in vista della carne, che tende al coriaceo, e per la durata abbastanza lunga della sua vita, si devono sempre scegliere individui giovani o di mezzo sviluppo, e rigettare inoltre la parte inferiore del gambo, troppo fibrosa, onde riesca veramente gradevole e di facile digestione. Si può facilmente disseccare e usare come condimento, invece delle droghe, alla guisa del Prugnolo, del Prataiuolo, del Cicciolo ecc. conservando egli pure, anzi aumentando l'aroma colla disseccazione. Per questa sua proprietà si trova in commercio, specialmente in Francia e Germania, e si apprezza al pari dei funghi suddetti. Non si può confonderlo con specie venefiche, essendo tutte quelle che gli assomigliano o mangerecce o almeno innocue.

Spiegazione delle figure: *a* Gruppo di funghi in vario grado di sviluppo. *b* Sezione verticale di un individuo. *c* Basidii. *d* Spore.

Genere *Volvaria*.

Funghi carnosì con cappello e gambo, forniti di volva, ma senza anello; tessuto del gambo distinto da quello del cappello; lamelle al piede libere, di color roseo o carnicino; spore ovate o ellissoidee, lisce, di tinta *rosea*.

VOLVARIA SPECIOSA Fr. Tav. XLIV.

Ital. *Volvaria bianca*. Franc. *Volvaire blanche*. Ted. *Anschmlicher Blätterschwamm*.

Ha cappello da campanulato espanso-gibboso o largamente umbonato, glabro, *viscoso*, di colore biancastro con tinta pa-

glierina ai margini e grigia al centro; lamelle spesse, nel fungo giovanissimo bianche, poi roseo-carnicine, col taglio finamente fimbriato, verso il gambo rotondato-libere; gambo pieno, alto, all'apice attenuato, fibrilloso, bianco, ingiallentesi coll'età, alla base fornito di volva membranacea, libera, biancastra, col margine lobato; carne bianca, molle, di odore sgradevole; basidii clavati, 40-45 11-13 μ .; spore obovate, color carnicino, 15-18 8-10 μ .

Nasce negli orti, nei prati, ai margini delle vie, nei ruderi ecc. da maggio in ottobre.

È specie *venefica* che si potrebbe confondere, osservandola superficialmente, colla Tobbietta bianca (Tav. XV) o colle forme più elevate del Prataiuolo (Tav. LII-LIV), dai quali però subito si distingue per la *mancaenza dell'anello* e per la *presenza della volva*. Si abbia cura quindi, alla raccolta, di osservare bene le parti sovra indicate e di farne i confronti colle tavole citate.


Spiegazione delle figure: *a* Fungo quasi interamente sviluppato. *b* Sezione verticale. *c* Basidii. *d* Spore.

VOLVARIA GLOJOCEPHALA Dec. Tav. XLV.

Ital. Volvaria fuliginosa. Franc. Volvaire grise.


Ha cappello campanulato, poi espanso-umbonato, col margine in età striato, *viscoso*, di color fuliggine o bruno-marrone; lamelle spesse, larghe, verso il gambo rotondato-libere, da bianche carneo-rossastre, al taglio sottilmente dentate; gambo solido, lungo, attenuato all'apice, bianco, poi diventante fuliginoso, alla base cinto da una volva membranacea, bianca, lobata al margine; carne bianca, di odore nauseante; basidii clavato-subfusoidi, 45-50 14-15 μ .; spore obovate, rosee, 13-16 8-9 μ .

Nasce nei medesimi luoghi e nella medesima stagione della Volvaria bianca, della quale ha pure le *proprietà venefiche*. Si può confondere colle forme grigio-seure dell'A-



Volvaria glojocephala De C. (*Volvaria fuliginosa*)

(VELENOSO)



Entoloma clypeatum Linn. (Agarico clipeato)



manita vaginata (Tav. XII), specie mangereccia. Per distinguerla con sicurezza si osservino le lamelle, le quali nella *Volvaria glojocephala* sono *rossastro-carnicine* e nella *Amanita vaginata* sempre *bianche* o con *leggera tinta grigiastro* nel fungo molto sviluppato.

Spiegazione delle figure: *a-b* Due individui in vario grado di sviluppo. *c* Sezione verticale d'un individuo. *d* Basidii. *e* Spore.

Genere *Entoloma*.

Funghi carnosio-fibrosi, con cappello e gambo, senza anello e volva; tessuto del gambo contiguo a quello del cappello; lamelle smarginate, di colore roseo; spore poligonali, pentagone o esagone, *rosee*.

ENTOLOMA CLYPEATUM Linn. Tav. XLVI.

Ital. Agarico elipeato. Franc. Mousseron des haies.

Ha cappello convesso-subcampanulato, poi piano-umbonato, con margine sinuato-repando, secco, sericeo, di colore fuliginoso-grigiastro rischiarantesi nel fungo adulto; lamelle non tanto spesse, larghe, sinuato-uncinate al gambo, bianco-grigiastre nel fungo giovane, indi carnicino-sporco, al taglio irregolarmente crenulate; gambo eguale, fibrilloso, bianco, all'apice pruinato, pieno, poi cavo; carne bianco-grigiastro, fibrosa nel gambo, di odore e sapore poco marcato, gradevole; basidii clavato-fusoidei, 30-40-10-12 μ .; spore carnicine, angolate, per lo più di forma pentagonale, del diametro di 8-10 μ .

Nasce nei prati dove si trovano alberi o nei luoghi erbosi, pascoli ecc. coperti da alberi a foglia, nell'estate e autunno, solitario o a cespi, per lo più in lunghe file.

È *mangereccio* e di buonissimo gusto. Basta una mezza ora o poco più per la cottura. È facilmente invaso dagli insetti, per cui conviene scegliere con accuratezza gli esem-

plari sani e non corrosi. Non si può confondere con specie nocive.

Spiegazione delle figure: *a* Cespito di Funghi. *b* Individuo sezionato. *c* Basidii. *d* Spore.

Genere *Clitopilus*.

Funghi carnosì con cappello e gambo, senza volva e anello; tessuto del gambo omogeneo con quello del cappello; lamelle scorrenti sul gambo, colorate, con tinta rosea o carnicina; spore lisce o angolate, *roseæ*.


CLITOPILUS PRUNELLUS Scop. (*Agaricus Oreella* Bull.)
Tax. XLVII.

Ital. Grumato grigio, Prugnolo bastardo. Volg. Paste, Pastine, Fungo dal lievito, Lievitato, Oladivo. Franc. Mouseron d'automne. Ted. Oreellas Blätterschwamm.

Ha cappello da convesso spianato-depresso, cogli orli arrotolati verso le lamelle, di color cinereo o cinereo-biancastro o anche quasi bianco, talora con zone concentriche più scure, secco e morbido come pelle di guanto; lamelle spesse, strette, scorrenti sul gambo, da prima bianche o grigiastre, poi carnicino pallido; gambo solido, eguale o ingrossato alla base o anche ventricoso, bianco, centrale o eccentrico, talora anche laterale, al piede coperto da bianca lanuggine; carne bianca, pastosa, di sapore dolce e di odore assai marcato di pasta lievitata; basidii clavati; spore fusoides, rosee, 10-13 : 5-6 μ , con nervature longitudinali a perfetta maturanza.


Nasce dovunque tanto nelle selve di conifere che nei boschi a foglia dal giugno all'ottobre, sparso qua e là senza disposizione speciale.

Questa specie è senza dubbio una delle *più gustevoli*. Possiede una carne tenera, delicata, presto cotta e gradevolissima. Il modo migliore di prepararlo è ad uso frittura, come ho indicato al n. 3° del paragrafo che tratta della cucin-



Clitopilus prunulus Scop. (Grumato grigio)





Pholiota caperata Pers. (Agarico grinzoso)

natura dei Funghi. Riesce buonissimo anche disseccato, aumentando di aroma, e serve pure come condimento. Non si può confondere con specie nocive, ed inoltre per il suo speciale odore di lievito è facilissimo il riconoscerlo anche dai meno pratici.

Spiegazione delle figure: *a-c* Fungo nei varii gradi di sviluppo. *d* Fungo sezionato verticalmente. *e* Basidii. *f* Spore.

Genere *Pholiota*.

Funghi carnosì con cappello e gambo, forniti di anello, ma generalmente senza volva; tessuto del gambo omogeneo con quello del cappello; lamelle al gambo generalmente smarginate, colorate, di tinta ocracea, ferruginea o ombrina; spore lisce, obovate o ellissoidee, *ocracee* o *ombrine*.

PHOLIOTA CAPERATA Pers. Tav. XLVIII.

Ital. Agarico grinzoso. Franc. Agaric ridé. Ted. Runzli-ger Blätterschwamm.

Ha cappello da convesso-emisferico espanso, da prima coperto da squamette bianche, pelose, poi glabro e rugoso specialmente verso il margine, di colore giallo-paglierino, qua e là più o meno marcato; lamelle spesse, al gambo smarginate e col taglio seghettato, di colore da prima giallo-pallido, poi ocraceo; gambo solido, sopra l'anello bianco e squamuloso, sotto fibrilloso con tinta paglierina, eguale o verso la base ingrossantesi; anello membranaceo, distante, sovente obliquo, bianco, con zona ocracea; volva tenue come pellicula, all'apice libera, bianca o con tinta gialla, presto svanente e visibile soltanto negli individui giovani; carne color paglia, di odore e sapore leggero, grato; basidii clavati, 40-45 μ ; spore allungate, quasi a forma di mandorla, di color ocraceo, 13-15 μ .

Nasce copioso in circoli fra il muschio nelle selve alpine di conifere, come in Val di Sole, Rabbi, Andalo, Rumo, Panegggio ecc.


L'Agarico grinzoso è fungo *mangericcio* ma non dei migliori. La carne del gambo è piuttosto tenace e fibrosa e perciò deve essere ben cotta. Negli esemplari più sviluppati sarebbe meglio rigettare la parte del gambo sotto l'anello. Preparato bene riesce abbastanza saporito e certamente più gradevole di altre specie che si reputano buone. Merita quindi di essere conosciuto ed utilizzato negli usi culinari. Non vi sono specie venefiche colle quali può essere confuso; ha invece molta somiglianza con diverse specie di Cortinari o insipide o sospette, dalle quali si potrà facilmente distinguere per l'anello e la volva. I Cortinari non posseggono volva, nè hanno anello membranaceo, ma soltanto una cortina fibrillosa come tela di ragno o bambaggiosa da simulare un anello.

Spiegazione delle figure: *a-b* Due individui in vario grado di sviluppo. *c* Individuo veduto dalla parte lamellare. *d* Individuo sezionato. *e* Basidii. *f* Spore.

PHOLIOTA PRAECOX Pers. Tav. XLIX.

Ital. Agarico primaticcio, Marzuolo. Volg. Fonghi marziol (Veneto), Ciodeli. Franc. Le précoce. Ted. Frühschwamm.

Ha cappello da convesso-spianato, depresso o anche leggermente umbonato, umido e un po' viscido a tempo piovoso, di colore da prima bianco sporco o bianco con sfumatura fuliginosa, indi gialliccio nel centro e biancastro al margine; lamelle spesse, verso il gambo smarginate e uncinato, di colore bianco-acquoso nel fungo giovane e canella-scuro nel fungo adulto; gambo eguale o ingrossato alla base, internamente midolloso, poi vuoto, pubescente, bianco e in età oscurantesi, fornito di anello membranaceo, supero, lacerato,



Pholiota praecox Pers. (Agarico primaticcio)

che svanisce nel fungo interamente sviluppato; carne bianca, molle; basidii clavati, 30-8 μ .; spore di colore ferruginoso, ovato-allungate, 9-11-5-6 μ .

Nasce nei luoghi erbosi lungo le strade, al margine delle selve, dei campi, prati ecc. dall'aprile all'estate, solitario o a pochi individui qua e là sparsi.

È specie *affatto innocua*, ma per la carne troppo molle e di sapore appena marcato riesce di qualità ordinaria. È da preferirsi, quindi, invece che solo, di usarlo in unione ad altre specie. Non si può confondere con funghi velenosi.

Spiegazione delle figure: *a* Fungo giovane con brandelli di anello attaccati al margine del cappello. *b-c* Due individui di pieno sviluppo. *d* Individuo sezionato. *e* Basidii. *f* Spore.

PHOLIOTA AEGIRITA (Porta) Brig. (*Ag. cylindraceus et attenuatus* Dec. *Ag. pudicus* Fr. vix Bull. *Ag. Brigantii* Fr. *Ag. Pioparello* Viv.) - Tav. L.

Ital. Pioppino, Piopperello. Volg. Fungo di pioppo, Fong de albera, Fong de salgar. Franc. Champignon du peuplier, Pivoulade.

Ha cappello da convesso o quasi campanulato spianato, sovente umbonato o gibboso, nel fungo giovane rugoso e crespato, nel fungo adulto liscio, a epidermide come pelle di guanto che poi si screpola in areole poligonali (fig. *e*), di colore da prima fuliginoso-chiaro, poi giallo-fulvente al centro e pallido al margine; lamelle spesse, larghe, verso il gambo troncato-aderenti ed uncinato, da pallido-giallastre canella-scuro; gambo solido, eguale o attenuato alla base o anche ingrossato, bianco, oscurantesi coll'età, sopra l'anello fibrilloso, sotto squamosetto-lacero; carne bianca o pallida, tenace, nella parte inferiore del gambo giallo-fosca, di sapore mite ed odore molto marcato e gradevole; basidii clavati, 23-25-7-9 μ .; spore ellittiche o reniformi, giallognole, 9-11-6-7 μ .


Nasce in primavera ed autunno sui tronchi vivi o sulle ceppaglie di pioppo, salice, sambuco, robinia ecc. Nei dintorni di Trento si trova frequente in Campo Trentino sui salici e sul pioppo nero e lungo il passeggio del Fersina sul pioppo piramidale; a Rovereto, Ala, Sarche sul pioppo nero.

È specie *mangereccia* molto delicata, già conosciuta come tale e stimata dai Greci e dai Romani, presso i quali anzi si coltivava artificialmente. Mattioli nei suoi *Commentarii di Dioscoride* ci narra il metodo di coltura di questo fungo, usato dai Greci, che consisteva nel tagliare i tronchi del pioppo rasente terra e poi irrorarli con acqua calda in cui fosse sciolto del fermento. Con tale trattamento si ottenevano i funghi dopo quattro giorni ¹⁾. Plinio celebra le varie specie di pioppo pei funghi squisiti che producono ²⁾; e la riproduzione artificiale praticata dai Romani è ancora in uso in qualche luogo d'Italia, anzi meriterebbe di essere introdotta dovunque essendo assai semplice e poco costosa. Consiste nel tagliare a pezzi dei ceppi o tronchi di pioppo e collocarli in luogo umido tenendoli di frequente bagnati con acqua tepida, oppure nel porre dei frammenti di legno o di scorza di pioppo nella terra commista a letame di stalla, onde agevolarne la putrefazione e procurare di conservarla sempre umida. Crescendo questa specie anche sul salice, ritengo che si otterrebbe il medesimo risultato sottoponendo allo stesso trattamento anche pezzi di legno di questo albero.


Spiegazione delle figure: *a-b* Due individui completamente sviluppati. *c* Due individui con cappello areolato a cagione del tempo secco e dell'età. *d* Individuo sezionato. *e* Spore.

¹⁾ MATTIOLUS, editio Francof. 1592, pag. 768.


²⁾ *Hist. Nat.* libr. XVI, cap. 35.



Pholiota aegerita Brig. (Pioppino)



Pholiota mutabilis Schaeff. (Famigliuola gialla, buona)



PHOLIOTA MUTABILIS Schaeff. Tav. LI.

Ital. Famigliuola gialla, buona. Volg. Brochie, Brochete (Veneto). Franc. Agaric changeant. Ted. Wandelbarer Blätterschwamm.

Ha cappello da convesso-gibboso spianato-umbonato, igrofano, allo stato vegeto di colore nel centro fulvo e al margine giallo, a tempo secco tutto uniformemente giallastro o canella; lamelle spesse, verso il gambo attaccate allo stesso e talora un po' decorrenti, da prima giallognole, poi fosco-canella; gambo pieno, poi cavo, tenace, sopra l'anello pallido, sotto tutto coperto da eleganti squamette scabrose, fosco-ferruginee; anello membranaceo, esteriormente fioccoso-scaglioso, del medesimo colore; carne bianco-giallastra nel cappello, giallastro-scura nel gambo, di odore grato da frutta; basidii clavati, 20-25 6-7 μ .; spore di colore ferruginoso, obovate, 6-7 4 μ .

Nasce dalla primavera all'autunno sulle ceppaglie in putrefazione di alberi a foglia, specialmente di ontano e figlio, in famiglie numerose d'individui, riuniti tra loro alla base in cespi.

È fungo *molto saporito* come lo sono quasi tutti i funghi primaverili. Convieni però raccoglierlo non troppo sviluppato e rigettare la parte del gambo sotto l'anello, perchè è troppo fibrosa e tenace ed inoltre ha un leggier sapore di legno che non perde colla cottura. Vi sono molte altre specie, o insipide o sospette, che crescono in famiglie sui ceppi, come la *Pholiota mutabilis* e che, osservando il solo modo di crescere, potrebbero confondersi colla stessa; però se si confronteranno i caratteri qui sopra esposti, specialmente il gambo fornito di anello e di squame, non vi sarà pericolo di ingannarsi e di prendere una specie per l'altra. Crescendo già in primavera merita d'essere a preferenza conosciuto pel motivo che in questa stagione i funghi mangerecci sono più rari.

Spiegazione delle figure: *a* Cespo di funghi. *b* Fungo sezionato. *c* Basidii. *d* Spore.

Genere *Cortinarius*.

Funghi carnosio-fibrosi con cappello e gambo, senza volva, ma con velo a guisa di tela di ragno che unisce il margine del cappello alla sommità del gambo; tessuto del gambo omogeneo con quello del cappello; lamelle colorate, cerulee o cinnamomee, al piede per lo più smarginate; spore *gialle*, generalmente a forma di mandorla, con episporio granulato o puntato-scabro, raramente lisce.


CORTINARIUS FIRMUS Fr. — Tav. LVII.

Ital. Cortinario compatto. Franc. Agaric araigneux.

Ha cappello da emisferico piano-depresso coi margini rilevati, secco, da giovane di color pallido-canella col margine lilacino, poi tutto canella-carico, a tempo secco sovente colla epidermide areolato-screpolata; lamelle spesse, da prima pallido-lilacine, indi canella-oceracee, verso il gambo attaccate o smarginate; gambo solido, fibrilloso, alla base bulboso, lilacino-cinereo, poi nel fungo adulto pallido-canella; carne biancastra, compatta, di sapore grato ed odore forte non disagiata; basidii clavati, 30-35 \times 8-9 μ ; spore quasi a forma di mandorla, gialle, con episporio granulato, 10-12 \times 6 μ .


Nasce in circoli o in file nelle selve di conifere a mezza montagna, assai copioso nei mesi di giugno e luglio.

Il Cortinario compatto deve annoverarsi fra le specie *mangerecce* più saporite. Per la compattezza della carne e per l'aroma si avvicina molto al Prugnolo (Tav. XXVIII). Come lo stesso si presta anche per essere disseccato e quale condimento. Nel prepararlo, onde riesca veramente gradevole, si deve aver cura di cuocerlo bene a motivo della carne che è piuttosto tenace. — Vi sono parecchie specie di Cortinarii che gli si assomigliano tanto per la forma che per il colore,



Psalliota arvensis Schaeff. (Pratajuolo maggiore)





Cortinarius firmus Fr. (*Cortinario compatto*)



le quali però crescono soltanto in autunno ed inoltre hanno il cappello da vegeto viscoso. Del resto anche queste non sono venefiche, ma soltanto insipide o di difficile digestione.

Spiegazione delle figure: *a-c* Individui in vario grado di sviluppo. *d* Individuo sezionato. *e* Basidii. *f* Spore.

Genere Psalliota.

Funghi carnosì con cappello e gambo, forniti di anello ma senza volva; tessuto del gambo distinto da quello del cappello: lamelle libere, da bianche rosee, poi nere; spore lisce, *fosco-porporine*, ellittiche.

PSALLIOTA ARVENSIS Schaeff. (*Ag. exquisitus* Vitt.)

Tav. LII.

Ital. Prataiuolo maggiore. Franc. Boule de neige. Ted. Ehegürtel.

Ha cappello da conico-campanulato convesso-espanso, fiocoso-farinoso, poi glabro o subsquamuloso al margine, dov'è pure, almeno nel fungo giovane, a rialzi e cime, di colore bianco; lamelle spesse, al gambo rotondato-libere, da bianche pallido-rosee, indi nere; gambo pieno, poi vuoto, alla base bulboso, bianco; anello espanso, revoluto, esteriormente coperto da squame raggianti che simulano un secondo anello; carne bianca, appena tinta di rosso vicino alle lamelle nel fungo adulto, di grato odore e sapore; spore color fosco-porporino, obovate o subreniformi, $7-4\mu$.

Nasce gregario nei luoghi campestri al margine dei boschi dall'estate all'autunno.

È uno dei funghi *mangerecci* più delicati e di gusto veramente squisito. La sua carne è tenera e subito cotta. Disseccato si presta ottimamente come condimento per l'aroma particolare che comunica alle vivande. Non è facile confonderlo con specie venefiche se si attende alle note specifiche quivi esposte. Il fungo pericoloso che gli si avvicina, spe-

cialmente nel primissimo sviluppo, è la Bubbola di primavera (*Amanita verna*, Tay. IV), ma si scorderà subito la differenza se si porrà mente alla volva che questo fungo possiede e che manca sempre nel Prataiuolo maggiore; nel fungo sviluppato poi appariranno maggiormente le altre note, tra le quali le lamelle di color rosa che poi diventano nerognole.

Spiegazione delle figure: *a* Individuo veduto di profilo. *b* Individuo veduto dalla parte inferiore. *c* Individuo sezionato. *d* Basidii. *e* Spore.


PSALLIOTA CAMPESTRIS Linn. - Tav. LIII.

Ital. Prataiuolo. Volg. Fong de la rosada, Fong de pra, Puiòn (Verona), Fungo della Rosa (Valsugana). Franc. Champignon de Couce. Ted. Gemeiner Champignon.

Ha cappello da globoso convesso-espanso, secco, sericeo-fioccoso o coperto da squamette scure, di colore bianco che nel fondo si tinge in roseo, indi in nerognolo, specialmente al margine coll'età; lamelle spesse, al piede rotondato-libere, color roseo-carnicino, diventanti nere nel fungo a perfetta maturanza; gambo solido, un po' fioccoso, poi glabro, eguale o ingrossato alla base, bianco, munito di un anello membranaceo-fioccoso che presto sparisce; carne bianca che al taglio assume una tinta leggermente vinata, di odore e sapore grato e penetrante; basidii clavati; spore ellissoidee, fosco-porporine, 7-9 5-6 μ .

Nasce nei luoghi incolti, specialmente sulla terra impinguata con concime cavallino, nei campi, prati, pascoli, al margine dei boschi, sui campigoli delle malghe in montagna ecc. per lo più gregario dall'estate all'autunno.

È fungo di *buonissimo gusto* e di facile digestione. Per le sue ottime qualità divenne d'uso generale nell'economia domestica, anzi si può dire l'unico fungo che già da tempo immemorabile sia coltivato alla guisa degli altri vegetali. La coltura del Prataiuolo è molto diffusa nell'Inghilterra,



Psalliota campestris Linn. var. *alba*. (Pratajuolo)



Germania, Francia, Belgio ecc. Dei tratti abbastanza grandi di terreno vengono a questo scopo impiegati, specialmente nel Belgio, dove costituisce per alcuni giardinieri un ramo quasi principale di commercio, giacchè disseccato si vende a carissimo prezzo sotto il nome di *Champignon*, e costituisce uno dei condimenti più ricercati. Tale coltura si può fare anche in piccolo, per le singole famiglie, tanto nella stagione calda all'aria aperta, come nella fredda, nelle serre, cantine ecc. con fungaie di poca spesa dietro il seguente metodo:

Si preparano delle cassette di legno, lunghe da $1\frac{1}{2}$ a 2 metri e profonde 1 metro circa, si riempiono di concime cavallino vecchio, ma che non abbia ancora finita la fermentazione, mescolato con paglia tagliuzzata, e si lascia riposare per una quindicina di giorni, affinchè la paglia putrefacendosi si unisca al concime e si sodi. Allora vi si pone sopra uno strato di terra grassa di lettiera dello spessore dai 9 agli 11 centimetri e vi si sotterra il *micelio* o le radici del Prataiuolo. Preparata così la fungaia si deve frequentemente irrorare con acqua in cui vi sia sciolto un po' di salnitro. Affinchè l'umidità si conservi meglio e agevoli la propagazione del micelio nella lettiera, è bene tenere coperte le casse per alcuni giorni. Se poi vi si sviluppano altri funghi, questi si devono tosto sradicare. Quando s'incomincia la raccolta del Prataiuolo non si devono sradicare i funghi ma tagliarne il gambo sopra terra, altrimenti si estrae la radice, e si distrugge con ciò almeno in parte la fungaia. La quale però dopo un'abbondante produzione per parecchio tempo si esaurisce da sè, ed allora conviene rinnovarla, secondo il metodo sopra indicato, avendo cura di prendere il *micelio* della fungaia vecchia per porlo nella nuova.

Il *micelio* per la prima fungaia si può procacciarselo da sè prendendo della terra nei luoghi dove il Prataiuolo cresce spontaneamente, e precisamente quella che sta alla base del gambo dei singoli individui. Ivi si osserveranno facilmente radicine bianche che si intralciano e conglomerano in massa

compatta parte del terreno. Il complesso di tali filamenti è appunto quello che si dice *micelio* o radice del Prataiuolo. Tale *micelio* si trova anche in commercio sotto il nome di *Bianco di Champignon*.

Si osserva che gli individui coltivati riescono di molto inferiori nel gusto a quelli che nascono spontanei nei luoghi aperti; anche il colore si modifica ed assume una tinta generale scura, brunastra. Onde non perdano troppo l'aroma si devono raccogliere quando sono giovani e non abbiano oltrepassato il medio sviluppo. Tale norma deve pure seguire nella raccolta del Prataiuolo spontaneo. Si devono sempre scegliere esemplari colle lamelle rosee o porporine, trascurando affatto quelli aventi le lamelle già nereggianti, perchè troppo vecchi.

Spiegazione delle figure: *a-b* Individui di vario sviluppo. *c* Individuo sezionato. *d* Basidii. *e* Spore.


PSALLIOTA CAMPESTRIS Linn. var. EDULIS Vittad.

Tav. LIV.

Ital. Prataiuolo edule.


Ha cappello da globoso piano-convesso ed un po' depresso nel mezzo, coi margini rivolti verso le lamelle, di colore bianco e talora qua e là tinto di giallo, in età sovente longitudinalmente screpolato o anche areolato; lamelle da bianche rosee, poi bruno-nereggianti, col taglio bianco, al gambo rotondato-libere; gambo solido, corto e grosso, biancastro, alla base radicato, munito di anello ampio, infero, riflesso, sotto tomentoso, sopra glabro e striato e di volva membranacea, vicina all'anello, colore biancastro-sporeo, in età rivolta in giù da sembrare un secondo anello; carne bianca, al taglio leggermente vinoso, d'odore e sapore assai grato; basidii clavati, 25-30 μ .; spore foscio-porporine, ellittiche, 7-8 \times 5-6 μ .

Nasce per lo più gregario nei luoghi sabbiosi, ai lati



Psalliota campestris Linn. var. *edulis* Vitt. (Pratajuolo)





Psalliota pudica Viv. (Pratajuolo pudico)



delle strade ecc. dal maggio all'ottobre. A Trento si trova sotto gli ippocastani al passeggio del Fersina e nei viali ai giardini della Stazione, dal Seminario al ponte di S. Lorenzo.

Ha le medesime proprietà *mangeresce* del Prataiuolo, del quale si considera come varietà, e si adopera pei medesimi usi. Tanto il Prataiuolo comune che questa sua *varietà* non possono essere confusi con altre specie se si osserva il colore delle lamelle. Nel primissimo sviluppo vi sono delle Amanite, p. es. l'Amanita verna (Tav. IV), le quali hanno la medesima forma, ma queste, sviluppate, conservano le lamelle bianche o biancastre, per cui non può nascere dubbio sulla specie.

Spiegazione delle figure: *a* Fungo giovane con volva manifesta ed anello ancora attaccato ai margini interni del cappello. *b* Gruppo di due funghi veduti dalla parte inferiore, in cui apparisce la volva in forma di anello, l'anello e le lamelle. *c* Fungo sezionato. *d* Basidii. *e* Spore.

PSALLIOTA PUDICA Viv. — Tav. LV.

Ital. Prataiuolo pudico.

Ha cappello da convesso-subemisferico spianato, liscio, biancastro, qua e là con tinta giallognola e verso il margine scura; lamelle spesse, rosee, poi carneo-fosche, al gambo rotondato-libere, al taglio finamente crenulate; gambo fistoloso, verso la base attenuato e raramente un po' bulboso, bianco oscurantesi coll'età, sopra l'anello fibrilloso-furfuraceo, sotto a piccole squame che spariscono al tatto o nel fungo adulto; anello distante, tenue, tomentoso-submembranaceo, presto svanente; carne bianca e diventante rosea al taglio nel cappello ed ocreacea alla base del gambo; basidii clavati, 25-30 μ ; spore ellittiche, foseo-porporine, 7-8 μ 5-6 μ .

Nasce nei luoghi erbosi, al margine dei campi, prati, lungo le vie ecc. dal maggio all'ottobre. Nei dintorni di Trento si trova a Gocciadoro,

È specie *mangereccia* di buon gusto, poco diversa dal Prataiuolo, col quale è anche facile confonderla quando gli esemplari sono vecchi.

Spiegazione delle figure: *a-b* Funghi in vario grado di sviluppo. *b* Fungo sezionato. *c* Basidii. *d* Spore.

Genere *Coprinus*.


Funghi con cappello e gambo, molto tenui, esilissimi, veliformi, con anello o senza, ma non volvati; tessuto del cappello distinto da quello del gambo; lamelle membranacee che tosto si sciolgono in un succo nero che sembra inchiostro; spore generalmente obovate, lisce, *uree*.

COPRINUS ATRAMENTARIUS Bull. Tav. LVI.

Ital. Coprino atramentario. Volg. Fong del salgar, Fong della salezza (Trentino), Pisciacani (Rimini). Franc. Agaric atramenteaire.

Ha cappello da obovato campanulato-espanso, colore grigiastro-cinereo, coperto al centro di squame viscoso, fulve, col margine da prima lobato, poi lacerato-solcato; lamelle spesse, larghe, verso il gambo attenuato-libere, ventricose, di colore da prima bianco-sporco, poi carnicino-fosco, indi nerreggiante, scioglentesi in un lattice nero; gambo cavo, sopra l'anello bianco e fibrilloso, sotto l'anello concolore, glabro o più spesso a piccole squamette del colore di quelle del cappello; anello incompleto, molto basso, verso la base del gambo nel fungo perfettamente sviluppato, manifesto per un circolo rilevato; carne del cappello con tinta carnicino-fosca, del gambo bianca, di sapore ed odore grato; basidii clavati; spore ovato-allungate, di colore fuliginoso, 10-12 μ \times 6-7 μ .

Nasce a grandi cespi in suolo pingue, per lo più vicino alla radice degli alberi, lungo le strade di campagna, gli ar-



Coprinus atramentarius Bull. (*Coprino atramentario*)

Bresadola dis

Lit G Eippi Trento



gini dei campi, dei prati ecc. Nei dintorni di Trento è molto frequente in Campo Trentino e Briamasco, agli argini dei campi sotto i pioppi e salici dalla primavera all'autunno.

È specie considerata *mangereccia* ed ha veramente buonissimo gusto. La carne è tenera, subito cotta e di facile digestione, ma conviene scegliere individui giovani escludendo assolutamente quelli che incominciano a sciogliersi in un succo nerastro, i quali sono pericolosissimi e producono avvelenamenti.

L'egregio signor dr. Fr. Rigos, medico distrettuale superiore in Cles, mi riferiva che questo fungo causò dei sintomi d'avvelenamento assai intensi e del tutto speciali in varie persone. Anche il dr. Cadonna e il dr. Catoni mi assicurarono di avere essi stessi talvolta sofferto dei gravi incomodi col cibarsene, specialmente quando al pasto facevano uso di vino nuovo, mentrechè non ebbero mai a soffrire bevendo soltanto acqua.

L'analisi chimica del *Coprino atramentario*, per quanto mi consta, non fu ancora fatta, e perciò non posso asserire se contiene elementi velenosi o meno: però visto che da molti si mangia impunemente e che dagli autori fu finora considerato esculento senza menomamente indicarlo sospetto o pericoloso in qualche circostanza, ritengo che i casi di avvelenamento indicati più sopra debbano attribuirsi a formazioni tomatiche prodotte dal principio di decomposizione del fungo, il quale incomincia a dissolversi in un lattice nero ancora prima del completo sviluppo. Deve essere quindi facile riscontrare nello stesso tracce dei veleni delle sostanze putrefatte, che appartengono appunto alla tomaina, dalla quale dipendono certamente i sintomi di avvelenamento riscontrati nelle persone che se ne cibarono senza dubbio quando era già subentrato un inizio di putrefazione.

Tutto considerato però, è da sconsigliarsi affatto l'uso di questo fungo per la difficoltà di conservarlo anche per breve tempo senza che entri in dissoluzione.

Spiegazione delle figure: *a* Gruppo di due individui in vario grado di sviluppo. *b* Individuo sezionato a cui fu tagliata la parte inferiore del gambo. *c* Basidii. *d* Spore.

Genere Gomphidius.

Funghi carnosì con cappello e gambo, senza anello e volva; gambo munito alla sommità d'un velo fioccoso-viscoso da sembrare un anello; tessuto del gambo contiguo a quello del cappello; lamelle mucilaginoso, di colore fuliginoso, scorrenti sul gambo; spore a mandorla, molto allungate, lisce, di *color ombrino*.


GOMPHIDIUS VISCIDUS Linn. Tav. LVIII.

Ital. Chiodello. Volg. Ciudo, ciodeto, ciodeti. Franc. Gros-clou-rouge. Ted. Klebiger Blätterschwamm.

Ha cappello da ovato conico-convesso, indi piano-umbonato, coi margini nel fungo giovane involti verso le lamelle e coperti da un velo filamentoso che li unisce al gambo, leggermente viscoso a tempo umido, glabro, liscio, di colore quadrello scuro, con tinta sovente rosso-vinata e poi macchiato di nero, in età tutto color terra d'ombra; lamelle assai distanti, scorrenti sul gambo, forcate o ramoso, di colore rossastro, ammerantesi; gambo solido, eguale o attenuato alla base, del colore del cappello o giallastro, fibrilloso o coperto da piccole squame nel fungo giovane; carne del cappello giallastra e ai lati rosso-quadrello, del gambo pure giallastra e alla base colore rabarbaro, senza odore o sapore speciale; cistidii allungati, 100-130 15-17 μ .; basidii clavati, 50-55 8-10 μ .; spore 16-18 6-7 μ .


Nasce dovunque, ma a preferenza nelle pinete, sparso qua e là senza ordine speciale, dall'agosto al novembre.

È specie *mangereccia* e di buon gusto. La carne, benchè un po' fibrosa nel gambo, è tenera e presto cotta. Non si può confondere con qualità ventiche. Anche le altre specie



Gomphidius viscidus Linn. minor. (Chiodella)





Boletus luteus Linn. (Boleto giallo)

B⁵⁵² Turco-Lazzari dis.

Lit. G. Zippel Trento



del genere *Gomphidius*, come il *Gomph. glutinosus*, *Gomph. roseus* e *Gomph. maculatus* sono innocue, ma non raccomandabili perchè troppo coperte di glutine, il quale riesce indigesto.

Spiegazione delle figure: *a-c* Fungo in vario grado di sviluppo. *d* Individuo sezionato verticalmente. *e* Cistidii. *f* Basidii. *g* Spore.

Famiglia delle Poliporacee.

Genere *Boletus*.

Funghi carnosì, muniti di cappello e gambo, con anello o senza, ma non volvati; imenio, cioè la parte inferiore del cappello, formato da uno strato di tubetti saldati insieme, facilmente staccabile dalla carne del cappello; bocche dei tubetti, che si chiamano pori, rotonde o angolate; spore *giallognole*, per lo più a forma di mandorla allungata e liscie, raramente globose o ovate e con episporio granuloso o aculeato.

BOLETUS LUTEUS Linn. Tav. LXXXV.

Ital. Boletto giallo. Volg. Fong delle caure, Brisa falsa. Franc. Cèpe jaune. Ted. Butterpilz.

Ha cappello da emisferico piano-convesso, da prima coperto di un glutine fosco-cioccolato o violaceo-scuro, poi giallastro più o meno carico a seconda dell'età o del tempo umido o asciutto; tubi gialli, cogli orifizzii (pori) del medesimo colore ma che si oscurano nel fungo adulto; gambo solido, cilindrico, talora un po' ingrossato alla base, fornito di anello membranaceo, bianco o con tinta violaceo-cioccolato nella parte inferiore, che poi svanisce lasciando un circolo scuro intorno al gambo, il quale è giallo sopra l'anello e punteg-

giato di granelli oscuri e sotto l'anello brunastro; carne molle, bianco-giallognola, tinta di carnicino al taglio nel fungo giovane, di odore e sapore appena sensibili; basidii clavati, 24-27 $6-8\mu$; spore gialle, a forma di mandorla, allungate, 6-8 $2\frac{1}{2}-3\mu$.

Vegeta a preferenza nelle pinete della zona delle valli e montana; a Trento si trova a S. Antonio, S. Rocco, dall'agosto al novembre.


Il Boletto giallo è poco conosciuto nel Trentino, mentre in Germania, Boemia ecc. viene recato in gran quantità sui mercati e considerato come specie *mangerveccia* molto apprezzabile. Convieni però raccoglierlo a tempo asciutto, quando la viscosità del cappello è sparita, e prepararlo per la cottura levandogli l'epidermide del cappello, lo strato dei tubetti che formano la parte inferiore dello stesso, l'anello e la parte inferiore del gambo.

Spiegazione delle figure: *a-b* Fungo in vario grado di sviluppo. *c* Fungo sezionato verticalmente. *d* Basidii. *e* Spore.

BOLETUS ELEGANS Schum. Tav. LXXXVI.

Ital. Boletto elegante. Franc. Cèpe élégant. Ted. Gelber Röhrenschwamm.

Ha cappello da emisferico piano-convesso, viscoso, di colore giallo più o meno vivo, sovente con macchie color ruggine; tubi giallo-zoffino, con orifizi del medesimo colore, col l'età oscurantesi, di forma rotonda o sinuata; gambo cilindrico, alla base talora ingrossato, munito verso la sommità d'anello bianco, poi giallastro che svanisce presto lasciando un circolo giallo-brunastro intorno al gambo, sopra l'anello talora reticolato o granuloso, sotto fibroso, del colore del cappello; carne molle, gialla, che al taglio nel fungo giovane assume una tinta lilacino-rosea, di odore appena marcato e di sapore un po' acido; basidii clavati, 25-30 $6-8\mu$; spore gialle, allungate, 8-10 $3\frac{1}{2}-4\mu$.



Boletus elegans Schum. (Boleto elegante)

Bresadola dis.

Dir. G. Zippel [Trer. to]



Cresce a grandi famiglie nelle selve alpine di larice dal luglio al novembre.

Possiede le *medesime qualità* del Boletto giallo, e si devono usare le medesime precauzioni per la raccolta e per la preparazione alla cottura.

Spiegazione delle figure: *a* Due funghi uniti a cespo in vario grado di sviluppo. *b* Fungo sezionato verticalmente. *c* Basidii. *d* Spore.

BOLETUS GRANULATUS Linn. Tav. LXXXVII.

Ital. Boletto granuloso, Pinuzzo buono. Volg. Fong delle vacche (Trentino). Franc. Cèpe pleureur. Ted. Kreis-pilz, Kühpilz.

Ha cappello da emisferico piano-convesso, viscoso, di colore brunastro-ferruginoso, diventante giallastro coll'età; tubetti corti, giallo-zolfini, con orifizi quasi rotondi, del medesimo colore, segreganti un umore latteo che apparisce all'esterno in gocce bianche; gambo solido, eguale o un poco ingrossato alla base, senza anello, giallo, coperto, specialmente all'apice, da granulazioni del medesimo colore che in età si oscurano; carne molle, gialla, mite, di odore non marcato; basidii clavati, 25-30 μ .; spore a mandorla, allungate, gialle, 8-10 \times 3-3 $\frac{1}{2}$ μ .

Vegeta a greggi numerosi, specialmente nelle pinete o negli erbosi e pascoli di montagna in vicinanza delle selve, dall'agosto al novembre.

Ha le *medesime proprietà* del Boletto giallo, al quale somiglia molto, distinguendosi quasi unicamente per la mancanza di anello e per la statura generalmente più piccola. Anche per questa specie sono da osservarsi le norme indicate pel Boletto giallo e Boletto elegante.

Spiegazione delle figure: *a* Gruppo di funghi in vario grado di sviluppo. *b* Fungo sezionato verticalmente. *c* Basidii. *d* Spore.

BOLETUS EDULIS Bull. Tav. LXXXVIII.

Ital. Porcino, Ceppatello buono, Volg. Brisa (Trentino) Fong ferrè, Bolè porcìn, Legorsela, Pressanella, Brisoto, Carpanote (Italia). Franc. Cèpe. Ted. Herrnpilz, Steinpilz.

Ha cappello da prima emisferico, poi guancialiforme, glabro, umido, non viscoso, di colore castagno-chiaro, castagno-nocciola o terra d'ombra; tubetti verso il gambo rotondato-liberi, bianchi, poi gialli, indi giallo-verdognoli, con orifizi del medesimo colore, per lo più rotondi; gambo da ventricosso allungato e cilindrico, solido, senza anello, color bianco-grigiastro, coperto da una reticolazione bianca, regolare; carne compatta, bianca, sotto l'epidermide del cappello con tinta carnicina, assai gustosa e di odore grato; basidii clavati, 40-50 10-12; spore giallo-verdognole, a mandorla, molto allungate, 15-17 4-5 μ .



Crece in tutte le selve dal giugno al novembre più o meno numeroso a seconda delle condizioni climateriche.

Il Porcino è uno dei funghi *mangerecci* più conosciuti e stimati; offre un alimento sano e nutriente, e disseccato si presta eminentemente come condimento aumentando di aroma. Per questa sua qualità è posto in commercio assieme all'Uovolo, al Prugnolo, al Prataiuolo ecc. sotto il nome generico di *Funghi secchi*. In questo stato era già assai ricercato fino dal tempo dei Romani, i quali lo ritiravano in gran copia dalla Bitinia e lo conoscevano sotto il nome di *Fungi suilli*; anzi molti lo preferivano all'Uovolo stesso, conosciuto sotto il nome di *Boletus*, donde quel verso di Martiale:

Sunt tibi *boleti*: *fungos* ego sumo *suillos*. *Epigr. Lib. III. 60.*


Il modo di prepararlo per la cottura è quello degli altri Boleti, cioè togliere l'epidermide del cappello, lo strato dei tubetti e la parte infima del gambo.

Spiegazione delle figure: *a-b* Fungo in vario grado di sviluppo. *c* Fungo sezionato verticalmente. *d* Basidii. *e* Spore.



Boletus granulatus Linn. (Boletto granuloso)






Boletus edulis Bull. (Porcino)





Boletus aereus Bull. (Porcino nero)





Boletus Satanas Lenz. (Boleto Satana)



BOLETUS AEREUS Bull. Tav. LXXXIX.

Ital. Porcino nero. Volg. Brisa, Brisa mora (Trentino), Carpanòte, Fung ferrè (Italia). Franc. Cèpe bronzé. Ted. Bronzpilz.

Ha cappello da emisferico guancialiforme, da giovane coperto da frequente rugosità, poi liscio, di colore castagno carico con fondo quadrello, indi traente al fulvo con macchie giallastre, non viscoso; tubetti verso il gambo rotondato-liberi e aderenti alla sommità, da bianchi giallo-verdognoli, con orifizzii del medesimo colore e di forma quasi rotonda; gambo da ovato-bulboso allungato-cilindrico, alla base per lo più ingrossato, solido, di colore carnicino che diventa giallastro nel fungo adulto; carne bianca, sotto l'epidermide carnicina, di buon sapore ed odore; basidii clavati, 35-40-10-12 μ .; spore a mandorla, allungate, 13-18 μ , giallo-verdognole.

Cresce a grandi famiglie, specialmente nelle selve di Pino e Abete a mezza montagna, dal giugno al novembre, ma non dovunque.

Il Porcino nero ha le *medesime proprietà* del Porcino, col quale viene comunemente confuso. Da noi è frequentissimo nella valle di Pinè e più raro nelle altre vallate. Sul mercato di Trento, dove concorrono a preferenza i Pinetani, è quasi sempre il Porcino nero che viene posto in vendita.

Spiegazione delle figure: *a* Fungo di mezzo sviluppo. *b* Fungo sezionato verticalmente. *c* Basidii. *d* Spore.

BOLETUS SATANAS Lenz. - Tav. XC.

Ital. Boletto Satana, Porcino malefico. Volg. Brisa matta. Franc. Cèpe du diable. Ted. Satanspilz.

Ha cappello da emisferico espanso-guancialiforme, secco, glabro, pubescente osservato alla lente, di colore biancastro-alutaceo con tinta olivastro-pallida; tubetti gialli, poi ver-

dastri, cogli orifizzii rosso-sanguinei e coll'età rosso-ranciati; gambo solido, da prima ventricoso-tuberoso, poi allungato, giallastro con chiazze rosse, coperto da una reticolazione di colore miniato; carne biancastra, al taglio diventante cerulea, di odore e sapore non marcato; spore allungate, gialle, 12-13 6-7 μ .

Cresce nelle selve, non tanto frequente nel Trentino, dall'estate all'autunno.

Il Boletto Satana è fungo *velenoso* di effetto quasi immediato, manifestandosi i sintomi d'avvelenamento poco dopo averlo mangiato. Nell'acqua calda il veleno precipita, per cui se viene bollito, e poi si getta via l'acqua, perde la forza deleteria e si può mangiare senza pericolo.

Spiegazione delle figure: *a-b* Due funghi aggruppati in vario grado di sviluppo, *c* Fungo sezionato verticalmente, *d* Spore.


BOLETUS LURIDUS Schaeff. Tav. XCI.

Ital. Boletto lurido. Volg. Brisa matta. Franc. Cèpe perfide. Ted. Ludenschwamm, Hexenschwamm.


Ha cappello da emisferico espanso-convesso, a tempo umido un poco viscoso, di colore vario, ombrino-olivaceo, rosso-fuligineo o più sovente alutaceo-giallastro con margine rossigno; tubetti verso il gambo rotondato-liberi, gialli, poi verdognoli, con orifizzii di colore cinabro-scuro o ranciato-miniato; gambo solido, alla base ovato-bulboso, giallastro, con macchie rossastre nella parte inferiore, coperto d'un reticolo con tinta rosea o carmino; carne nel fungo giovane quadrello-pallida, poi gialla e alla base del gambo rossa, al taglio ceruleo-verdastra, di sapore dolciigno ed odore appena marcato; basidii clavati, 45-50 12-14 μ .; spore gialle, a mandorla, 11-15 6-7 μ .


Cresce copioso dal giugno al novembre tanto nelle selve a foglia che di conifere.

Il Boletto lurido è specie *velenosa*; contiene la mede-



Boletus luridus Pers. (Boleto lurido)





Boletus scaber Fr. (Porcinello)



sima qualità di veleno che si trova nel Moscario e nella Tignosa bigia, conosciuta sotto il nome di Moscarina. Se però viene cotto nell'acqua salata, e poi, gettata l'acqua, si condisce secondo i metodi indicati, si può mangiare impunemente. Io lo vidi parecchie volte usato in questo modo senza produrre il minimo disturbo.

Spiegazione delle figure: *a* Individuo quasi interamente sviluppato. *b* Fungo sezionato verticalmente. *c* Basidii. *d* Spore.

BOLETUS SCABER. Fr. — Tav. XCII.

Ital. Porcinello, Alberello, Boletto scabro. Volg. Brisa, Brisot, Legorat. Franc. Cèpe gris. Ted. Kapuzinerpilz.

Ha cappello da emisfero convesso, molto meno carnoso degli altri Boleti sopra descritti, a tempo umido un po' viscoso, di colore bruno-grigiastro o bruno-quadrello; tubetti verso il gambo rotondato-liberi, bianchi, poi grigio-foschi, con orifizi del medesimo colore; gambo solido, sovente molto allungato, eguale o appena ingrossato alla base, di colore biancastro o cenerognolo con tinta paglierina e sovente alla base con macchie bluastre, tutto coperto da piccole squamette granulose; carne bianca, molle, al taglio diventante da prima leggermente vinata, poi verde-bluastro, di odore e sapore grati; basidii clavati, 30-35 9-12 μ .; spore fusoidi, paglierine, 13-18 5-6 μ .

Crece a individui solitari nelle selve e nei boschetti a foglia, specialmente di Bètula e di Tremola, raramente nelle selve di conifere, dal luglio all'ottobre.

Il Porcinello è fungo di *assoluta innocenza* ed anche di buon gusto; conviene però raccogliere esemplari giovani, in cui la carne sia compatta, e togliere lo strato dei tubetti e la parte inferiore del gambo che è troppo fibrosa. Colla cottura diventa quasi nero, ma ciò non toglie che si possa egualmente cibarsene senza timore che riesca dannoso.

Spiegazione delle figure: *a* Fungo perfettamente sviluppato. *b* Fungo sezionato verticalmente. *c* Basidii. *d* Spore.

BOLETUS VERSIPELLIS Fr. Tav. XCIII.

Ital. Porcinello ranciato. Alberello. Volg. Brisa rossa, Rossin. Franc. Cèpe orangé. Ted. Rothkopf.

Ha cappello da emisferico espanso-guancialiforme, secco, un po' tomentoso, poi glabro, col margine membranaceo rivolto verso i pori da sembrare una cortina appendicolata, di colore giallo-arancio; tubetti verso il gambo rotondato-liberi, bianchi, indi grigio-bruni, con orifizzii del medesimo colore; gambo solido, robusto, ingrossato verso la base, longitudinalmente rugoso-soleato e coperto da piccole squame fibroso-granulose, bianche o rossigno-seure; carne compatta, poi molle, bianca, al taglio diventante colore pallido-vinato, indi con tinta bluastra, mite e di buon sapore; basidii clavati, 30-35 = 10-12 μ .; spore giallognole, fusoido-allungate, 14-18 4-6 μ .


Cresce a famiglie nei boschi di piante frondose, specialmente di pioppi e tremule, dall'agosto all'ottobre.

Il Porcinello ranciato ha il medesimo gusto del *Porcinello*, ma è più ricercato a motivo della carne più compatta ed abbondante. Per la raccolta e preparazione si devono seguire le norme indicate per i Boleti in generale. Anche nel Porcinello ranciato la carne annerisce colla cottura, specialmente se gli individui scelti sono troppo sviluppati.

Spiegazione delle figure: *a-b* Fungo in vario grado di sviluppo. *c* Fungo sezionato verticalmente. *d* Basidii. *e* Spore.


Genere Polyporus.

Funghi carnosì, carnosò-tenaci, coriacei, sugherosi o legnosi, con cappello e gambo o cappello soltanto attaccato



Boletus versipellis Fr. (Porcinello ranciato)





Polyporus ovinus (Schaeff.) Fr. (Poliporo ovino)



posteriormente ai tronchi d'albero, senza anello e volva; imenio formato d'uno strato di tubetti non separabile dalla carne del cappello; pori di varia forma e grandezza; spore bianche o più raramente giallognole, cilindriche, obovate o ellittiche.

A questo genere sono da riferirsi la maggior parte dei funghi legnosi e coriacei che crescono sui tronchi degli alberi o sui legni marciti; pochissime sono le specie carnose e quindi mangerecce.

POLYPORUS OVINUS (Schaeff.) Fr. Tav. XCIV.

Ital. Poliporo ovino. Franc. Croquette de sapinières
Ted. Schafeuter.

Ha cappello da convesso-spianato, al margine irregolare, largamente lobato o sinuato, secco, glabro, con epidermide rotta coll'età in areole quadrilaterali o squame, di colore bianco-grigiastro, con tinta qua e là giallo-zolfino o quadrello; tubi nella parte inferiore del cappello molto corti, decorrenti sul gambo, bianchi, poi citrini, con orifizi quasi rotondi, piccoli, del medesimo colore; gambo solido, irregolare, per lo più eccentrico, verso la base tuberoso o eguale o anche attenuato, bianco, poi con macchie color citrino; carne bianca, poi color citrino, di grato odore e sapore da mandorla, basidii clavati, 20-5-6 μ .; spore bianche, con nucleo oleoso, quasi globose, 3-4 μ . di diametro.

Cresce a grandi famiglie nelle selve di conifere di montagna, sovente a cespi di due o tre individui saldati al piede, dall'agosto all'ottobre.

Il Poliporo ovino è fungo *d'assoluta innocenza* e di abbastanza buon gusto. Si usa anche in certe regioni alla guisa dei rapani, cioè tagliato a fette ancora crudo e condito con olio, sale e pepe, quale appresso alla carne, al pane ecc.

Spiegazione delle figure: *a-b* Fungo in vario grado di sviluppo. *c* Fungo veduto dalla parte inferiore. *d* Fungo sezionato verticalmente. *e* Basidii. *f* Spore.

POLYPORUS SCOBINACEUS (Cum.) Bres. (*Polyporus Pcs-caprae* Pers., *Pol. asprellus* Lev.) Tav. XCV.

Ital. Lingua di brughiera. Volg. Fongo barbòn, Barbon (Italia). Franc. Pied de mouton noir.

Ha cappello laterale, dimezzato, a forma di ventaglio, di colore castagno scuro, tutto coperto da piccole squamette della medesima tinta; tubetti (nella parte inferiore del cappello) corti, decorrenti sul gambo, di colore bianco-citrino, con orifizi molto larghi, a 4-6 angoli, allungati; gambo laterale, difforme, di colore citrino oscurantesi; carne bianca, compatta, diventante giallognola, di sapore ed odore appena sensibili; basidii clavati, 30-35 9-10 μ .: spore bianche, con nucleo oleoso, ovali, 9-9 $\frac{1}{2}$ 6 $\frac{1}{2}$ -7 μ .

Crece in famiglie specialmente nelle pinete fra l'erica in autunno. Nei dintorni di Trento si trova a S. Antonio, S. Rocco e nella pineta di Povo.


La Lingua di brughiera è molto stimata come fungo *mangereccio*, e nel Veneto (Friuli), dove è copioso, si usa prepararlo come il fegato alla veneziana.

Spiegazione delle figure: *a* Fungo di perfetto sviluppo. *b* Fungo sezionato verticalmente. *c* Basidii. *d* Spore.

POLYPORUS CONFLUENS (Alb. et Schw.) Fr. — Tav. XCVI.


Ital. Griffone, Poliporo confluyente. Volg. Fongo del pan. Franc. Polypore groupé. Ted. Semmelpilz.

Crece sempre a cespi: da un ceppo comune si sviluppano i gambi deformi, corti e bianchi che portano i cappelli di varia forma e dimensione, per lo più a ventaglio o irregolari, sovrapposti sovente l'uno all'altro a embrice. I cappelli sono glabri, coll'epidermide in età screpolata in areole poligonali, del colore di pane cotto; i tubetti corti, decorrenti sui gambi, bianchi, con orifizi del medesimo colore, da prima rotondi e piccoli, poi, a fungo bene sviluppato, larghi fino a due millimetri e mezzo, con margine




Polyporus scobinaceus (Cum.) Bres. (Lingua di brughiera)





Polyporus confluens Fries. (Griffone)





Polyporus frondosus (Fl. D.) Fr. (Griffio)





Polyporus frondosus (Fl. D.) Fr. (Griffo)

$\frac{1}{3}$ grandezza naturale.



frangiato; carne compatta, bianca, immutabile, di nessun odore speciale e sapore un po' amarognolo; basidii clavati, 12-15 \times 4-5 μ .; spore bianche, con nucleo oleoso, quasi globose, 4 \times 3 μ .

Cresce a grandi famiglie, sempre cespitoso, nelle selve di conifere a mezza montagna dal luglio all'ottobre.

Il Griffone è fungo *mangericcio* di qualità molto ordinaria per il sapore amaro che non perde neppure colla cottura e per la carne che diventa nel fungo bene sviluppato un po' tenace. Se però si raccolgono esemplari giovani e si leva l'epidermide del cappello, riesce abbastanza gustoso. Conviene tuttavia farne uso con moderazione, giacchè se si mangia in quantità può riuscire pericoloso.

Spiegazione delle figure: *a* Cespo di funghi. *b* Fungo sezionato verticalmente. *c* Basidii. *d* Spore.

POLYPORUS FRONDOSUS (Fl. D.) Fr. (*Polyporus Barrelieri* Viv.) Tav. XCVII e XCVII bis.

Ital. Griffo, Griffone, Poliporo frondoso. Volg. Fungo imperiale (Roma), Ciate d'ors de castagnar. Spongiola de castagnar (Trentino). Fong gato (Veneto), Barbescin (Genova). Franc. Polypore en bouquet. Ted. Klapperschwamm.

Questo micete si presenta sotto la forma di un cespuglio di varia dimensione; ha origine da un ceppo comune dal quale si sviluppano parecchi ordini di rami che sono i gambi, i quali vanno a finire nei cappelli a forma di ventaglio e disposti in serie concentriche da assomigliare ai varii petali di una rosa doppia. I cappelli sono di color bruno-fuliginoso, longitudinalmente rugosi e sottilmente fioccosi; i tubetti sono bianchi, corti, con orifizi del medesimo colore, da prima rotondi e piccoli, poi nel fungo perfettamente sviluppato abbastanza grandi, angolati o allungati; la carne è compatta, un po' fibrosa, di grato sapore e odore forte, un po' nauseante; i basidi sono clavati, 25-30 \times 9-8 μ .; le spore quasi globose o ovali, 5-6 \times 4 $\frac{1}{2}$ -5 μ .

Cresce in autunno sui tronchi di castagno ancora vivo dove si sono formate delle cicatrici.

Il Griffo è fungo *assai squisito*, di assoluta innocenza; ma a cagione della carne fibroso-tenacella conviene cuocerlo molto bene. Non si può confondere con specie venefiche.

Spiegazione delle figure: Tav. XCVII. *a* Cespo di funghi. *b* Sezione verticale di alcuni individui, *c* Basidii. *d* Spore. Tav. XCVII bis. Cespo di funghi veduto di fronte.

Famiglia delle Idnacee.


Genere *Hydnum*.

Funghi carnosì, carnosò-coriacci, coriacci o legnosi, con cappello e gambo o gambo soltanto, senza anello e volva; imenio, cioè la parte inferiore del cappello, formato da aculei di forma conico-appuntita, liberi uno dall'altro; spore per lo più colorate, *fosche*, globoso-angolate, con episporio tuberculato, più raramente lisce.

HYDNUM IMBRICATUM Linn. Tav. XCVIII.


Ital. Steccherino falso, Steccherino bruno, Gallinaccio squamoso. Volg. Barbon mato (Veneto). Franc. Hérisson gris. Ted. Hirschschwamm.

Ha cappello da convesso-ombelicato espanso-ciatiforme, con margine irregolare repando-lobato, di colore grigio-ombriño, poi brunastro, tutto coperto da larghe squame concentriche più rilevate al centro, di colore più scuro del fondo del cappello, la parte inferiore del quale è tutta fornita di aculei fragili, decorrenti sul gambo, di colore bianco-sporco, poi cinereo-brunastro; gambo robusto, eguale o bulboso alla base, fibrilloso, grigiastro, oscurantesi coll'età; carne bianco-grigiastrea, di nessun odore e di sapore un po' acido; basidii clavati, 25-30 \times 7-8 μ ; spore poligonali con episporio granuloso, giallastre, 5-6 \times 5 μ .



Hydnum imbricatum Linn. (Steccherino falso)





Hydnum repandum Linn. (Steccherino dorato)



Cresce in file o semicerchi assai abbondante nelle selve conifere di montagna dall'agosto all'ottobre.

Lo Steccherino bruno è fungo di *qualità ordinaria* per il poco gusto che ha la sua carne, per cui dev' essere bene condito. Nel prepararlo convien levare le squame del cappello, gli aculei e la parte inferiore del gambo.

Spiegazione delle figure: *a-b* Fungo in vario grado di sviluppo. *c* Fungo sezionato verticalmente. *d* Basidii. *e* Spore.

HYDNUM REPANDUM Linn. — Tav. XCIX.

Ital. Steccherino dorato, Gallinaccio spinoso. Volg. Barbon bianco (Veneto). Franc. Hérisson. Ted. Stoppelpilz, Süßling.

Ha cappello da convesso spianato, irregolare, a margine sinuato-lobato, pubescente, bianco-alutaceo o più spesso colore d'Isabella o di pan cotto; aculei decorrenti sul gambo, più o meno lunghi a seconda dell'età, da prima bianchi, poi del colore del cappello; gambo solido, irregolare, alla base eguale o tuberoso, sovente comato con altri individui, bianco, poi del colore generale del fungo; carne bianca, al taglio giallognola, di sapore acidetto ed odore non marcato; basidii clavati, 25-30 μ ; spore paglierine, ovali o quasi rotonde, 6-8 μ .

Cresce a grandi famiglie, sovente in serie allungate, tanto nei boschi di foglia che nelle selve di conifere dall'agosto al novembre.

Lo Steccherino dorato è delle specie *più delicate*; ha buonissimo gusto ed è presto cotto. Non si può confondere con specie venefiche. Somiglia molto al Gallinaccio per colore e forma, ma è subito distinto per gli aculei, onde il suo nome di Gallinaccio spinoso.

Spiegazione delle figure: *a-b* Fungo in vario grado di sviluppo. *c* Fungo sezionato verticalmente. *d* Basidii. *e* Spore.

Famiglia delle Clavariacee.

Genere Clavaria.

Funghi carnosi o carnosio-fibrosi, ramificati, a forma di cespuglio o più raramente semplici, cilindrici o a foggia di clava; rami alla base uniti a cespo o sviluppantesi da un tronco comune, deforme, talvolta sottile a guisa di gambo; imenio contiguo alla sostanza del fungo, disteso sopra tutta la superficie dei rami, tranne le punte; spore bianche o giallognole, ovate, globose o più frequentemente a forma di mandorla allungata, lisce, raramente con episporio granuloso o echinato.


CLAVARIA FLAVA Schaeff. Tav. C.

Ital. Ditola gialla. Volg. Manine gialle, Ciate d'ors, Didele. Franc. Coralloïde jaune. Ted. Gelber Stengelschwamm.

Da un tronco grosso 3-4 *cm* circa di colore bianco si sviluppano parecchi rami o piccoli tronchi, i quali si dividono in varie serie di ramoscelli dando al fungo un aspetto di piccolo cespuglio. I rami sono per lo più cilindrici, un po' scanalati al punto di divisione che è disposto ad arco o ad angolo molto ottuso; i ramicelli terminano generalmente in 2-3 punte ottuse o raramente dentati. Tanto i rami che i ramoscelli sono di colore zolfino, più o meno carico, e il tronco è sovente chiazzato di rosso-vinato. La carne è bianca, tenera, di buon gusto e di odore fungino. Le spore sono giallognole, allungate o quasi cilindriche, da 10-14 : 4-5 μ .


Cresce a grandi famiglie tanto nelle selve frondose che conifere dal luglio al novembre.

La Ditola gialla è la *più pregevole* di questo genere per la carne compatta, tenera e non fibrosa. Convieni però scegliere individui giovani pel motivo che la carne coll'età



Clavaria flava Schaeff. (*Ditola gialla*)





Clavaria botrytes Pers. (Ditola rosso-gialla)



diventa acidetta e perciò meno gustosa, ed inoltre sviluppa un sugo abbondante, che agisce come drastico, per cui mangiandone in abbondanza potrebbe recare dei disturbi gastrici, i quali però si possono evitare dando al fungo una mezza cottura nell'acqua salata e poi, gettata l'acqua, col condirlo nel solito modo.

Queste norme sono da seguirsi anche per le altre specie di Ditola le quali sono tutte *mangerecce* benchè più o meno saporite; cogliere cioè esemplari, in cui i rami e i ramoscelli non sieno ancora bene sviluppati; e se poi si vuol cibarsi anche di esemplari ormai maturi, purchè sieno sani, non corrosi dagli insetti nè patiti, sottoporli ad una mezza cottura come è indicato sopra.

Spiegazione delle figure: *a* Fungo perfettamente sviluppato. *b* Basidii. *c* Spore

CLAVARIA BOTRYTIS Pers. - Tav. CL

Ital. Ditola rosso-gialla, Clavaria botrite. Volg. Ciate d'ors, Didele, Manine rosse, Tajadelle. Franc. Coralloïde pourpre. Ted. Röhliche Barentatze.

Sviluppo e forma della Ditola gialla: tronco bianco; rami e ramicelli di colore da prima biancastro, poi ocraceo-pallido o cera-vergine; punte dei ramicelli più o meno rosso o granato; carne bianca, un po' amara, basidii clavati, 40-50 $6-8 \mu$; spore allungate, 15-18 $4-6 \mu$.

Crece copiosa in famiglie, a preferenza nelle selve di faggio o a foglia e raramente nelle selve di conifere, dal luglio al novembre.

La Ditola rosso-gialla è di *buon gusto*, ma meno stimata della Ditola gialla per la carne più fibrosa e tenace. Tanto per la raccolta che per la cottura si devono seguire le norme indicate per quest'ultima.

Spiegazione delle figure: *a* Fungo nel primo sviluppo. *b* Fungo completamente sviluppato. *c* Basidii. *d* Spore.

CLAVARIA AUREA Schaeff. Tav. CII.

Ital. Ditola dorata. Volg. Ciata d'ors. Manine gialle. Didele ecc. Franc. Coralloïde ocracée. Ted. Goldgelber Korallenschwamm.


Sviluppo e forma della Ditola giallo-rossa; differisce pel tronco meno sviluppato, pei rami più grossi, uniti e pei ramicelli meno alti, colle punte più ottuse, dentate e pel colore generale giallo d'oro; basidii clavati, 35-40-6-8 μ .; spore color paglierino, allungate, 10-12-5 μ .

Cresce meno copiosa delle precedenti e sempre a pochi individui tanto nelle selve conifere che frondose dall'estate all'autunno.

È *mangereccia* ed ha le *medesime proprietà* dell'antecedente, per cui si devono seguire le medesime norme per la raccolta e cottura.


Nelle selve si trovano molte altre specie di Ditola, ma ad eccezione della *Clavaria rufescens* Schaeff. e della *Clavaria pallida* Schaeff. sono molto più piccole, meno carnose e meno buone. Tutte però, come già osservai, sono mangerecce, ma in genere piuttosto amarognole. Ho dato il disegno soltanto delle tre più frequenti e più gustose. La *Clavaria rufescens* ha la forma e il colore della *Clavaria botrytis*: è però generalmente più grande e le punte dei rametti invece di essere di color rosso vivo o granato sono d'un rosso scuro, come di sangue grumato; la *Clavaria pallida* ha da prima una tinta generale carnicino-pallida, poi biancastro-alutacea, del resto ha la dimensione delle precedenti.

Spiegazione delle figure: *a-b* Fungo in vario grado di sviluppo. *c* Basidii. *d* Spore.



Clavaria aurea Schaeff. (*Ditola dorata*)





Geoplinia rufa (Jacq.) Pat. (Fungo di gelatina)



Famiglia delle Tremellacee.

Genere Guepinia.

Funghi gelatinoso-cartilaginei a forma di spatula, di petalo o di orecchio, alla base ristretti in una specie di gambo; imenio da un sol lato della spatula con basidii da prima globosi, poi ovati e divisi mediante un setto verticale in due semmenti a sterimmi molto lunghi; *spore bianche*, cilindriche, curvate.

GUEPINIA RUFA (Lacq.) Pat. — Tav. CIII.

Ital. Guepinia rossastra, Fungo di gelatina. Volg. Reclagne, Reccia de lever, (Trentino). Franc. Guepinie rougeâtre.

Ha la forma di spatula; sovente però la spatula è incartocciata e prende la forma di imbuto; nella parte superiore è liscia, nella parte inferiore o esterna, dove ha sede l'imenio, è rugosetta, tutta di colore uniforme incarnato-arancio o rosa-ranciato; carne gelatinoso-cartilaginea, quasi trasparente, del medesimo colore dell'esterno, ma più pallido; basidii ovati, divisi longitudinalmente, 10-11 μ .; spore jaline, cilindrico-curve, 9-11 μ 5-6 μ .

Cresce a cespi in grandi famiglie nelle selve abietine per lo più in luoghi umidi dall'agosto all'ottobre.

È specie di *assoluta innocenza*, ma di poco gusto ed un po' indigesta se venisse mangiata in quantità a motivo della carne gelatinoso-tenace.

Spiegazione delle figure: *a-b* Fungo perfettamente sviluppato. *c* Individuo sezionato verticalmente. *d* Basidii. *e* Spore.

II. GASTEROMICETEE.

Famiglia delle Licoperdacee.


Genere *Lycoperdon*.

Funghi di forma globosa, ovata o piriforme, con peridio semplice o doppio, di consistenza papiracea, liscio o aculeato; gleba (interno) da prima compatta, caseoso-molle, poi pulveracea, contenente l'imenio, nella parte basale per lo più cellulosa e sterile; imenio costituito da basidii clavati che generano le spore all'apice degli sterimmi; spore globose, *gialle*, con episporio generalmente granuloso o aculeato.

LYCOPERDON BOVISTA Linn. Tav. CX.

Ital. Vescia maggiore. Volg. Sloffa, Sloffa d'ors (Trentino), Petto di lupo, Pettino, Pett de loff, Loffa, Vessa (Italia). Franc. Lycoperdon géant.

Ha forma globosa, un po' ristretta e lacunosa alla base; la superficie è da prima un po' pubescente, poi liscia come pelle di guanto ed è formata da uno strato corticale, membranaceo, bianco o paglierino traente al nocciola, che coll'età screpola e si separa in arcole e poi cade; sotto lo stesso e' è una seconda membrana molto più sottile, persistente, e l'interno è formato da una sostanza compatta, omogenea, carnosa, bianca che maturando diventa gialla e molle-poltacea, che finalmente si dissecca e si scioglie in una polvere con fiocchi (capillizio) di colore olivaceo-fosco o tabacino. Questa polvere è costituita dalle sementi del fungo o spore, che sono globose, di colore giallo sotto il microscopio e che misurano dai $4-4\frac{1}{2}\mu$ di diametro.



Lycoperdon Bovista Linn. (Vescia maggiore)



Crece in estate e più rara in autunno nei prati o pascoli di montagna.

La Vesca maggiore, la più grande del genere, che raggiunge talvolta la dimensione d'una testa d'uomo e può pesare fino dai 3-4 chilogrammi, è uno dei funghi *più delicati*. Si presta a tutti i modi di cucinatura, ma a preferenza riesce gradita friggendola nel burro col metodo indicato al N.º 3 della cucinatura dei funghi. Convieni però scegliere individui giovani, in cui la polpa interna sia ancora compatta e bianca: quando incomincia ad ingiallire non serve più allo scopo. Non si può confondere con specie venefiche, giacchè tutte le Vesce sono buone e di facile digestione.

Spiegazione delle figure: *a* Fungo perfettamente sviluppato. *b* Sezione verticale dello stesso. *c* Spore. *d* Ho del capillizio.

LYCOPERDON CAELATUM Bull. Tav. CXI.

Ital. Vesca areolata. Volg. Sloffa, Sloffa d'ors, Pett de loff. Franc. Lycoperdon ciselé. Ted. Hasenstaubpilz.

Ha sovente la medesima forma e dimensione della Vesca maggiore, ma generalmente è molto più ristretta alla base dove termina talvolta in una specie di gambo. È circoscritta da una sola membrana, attaccata alla polpa interna e non libera come nella Vesca maggiore: la superficie è coperta da piccoli fiocchi foggianti a punta da sembrare degli aculei, che poi scompaiono ed appaiono in loro vece delle areole quadrangolari, fiocose, che resistono finchè il fungo si discioglie: l'interno non è tutto omogeneo, ma la parte superiore che corrisponde alla testa del fungo è carnosa, compatta e fertile, mentre la parte inferiore dove si restringe è fiocosa, sterile, tutta disposta a cellule o piccole cavità. La parte carnosa nel fungo giovane è bianca, poi diventa gialla e molle, indi si scioglie in una polvere fiocosa di colore olivaceo-tabacino. Le spore sono globose, lisce,

gialle, dai 4-5 μ . di diametro; i basidii clavati, 15-22 8-9 μ .; le ife del capillizio gialle, ramoso, lunghe fino ai 12 μ .

Cresce in file, sovente assai numerosa, nei prati di montagna, pascoli, in estate e più rara in autunno.

La Vescia areolata si presta ai medesimi usi della Vescia maggiore, ma è di qualità inferiore mancandole il gusto squisito della medesima. Nella scelta degli individui si deve aver riguardo all'età, quando la polpa è bianca; inoltre si deve togliere la parte cellulosa che forma la base del fungo, la quale è insipida ed indigesta.


Molte altre specie di Vescie vi sono, tutte più piccole delle due qui descritte e disegnate; talune anche fornite di un gambo abbastanza lungo che porta all'apice il ricettacolo di forma globosa: tutte, come già dissi, sono mangerecce, basta soltanto che vengano raccolte giovani, quando la polpa interna è ancora bianca e che nelle specie in cui la base è sterile, cioè composta di tessuto fioccoso e celluloso, venga tolta detta parte, servendosi pel cibo soltanto della parte compatta, omogenea e carnosa.

Spiegazione delle Figure: *a* Fungo perfettamente sviluppato, un esemplare però con base molto più ristretta a forma di gambo del generale. *b* Fungo sezionato verticalmente. *c* Basidii. *d* Spore ed ife del capillizio.

Famiglia delle Imenogastreacee.


Genere *Rhizopogon*.

Funghi carnosio-tenaci o coriacei, globosi, tuberiformi, con peridio membranaceo coperto da una reticolazione miceliale; gleba compatta, cellulosa, da prima bianca, poi colorata; imenio disteso nelle cellule della gleba e formato da basidii clavati o cilindrici, che generano all'apice dalle 2-8 spore; spore guttulate, di tinta paglierina e di forma ellittico-allungata.



Lycoperdon caelatum Bull. (*Vescia areolata*)





I. *Rhizopogon rubescens* Tul. (Trifolia falsa)
 II. *Tuber melanosporum* Vitt. (Tartufo nero)



RHIZOPOGON RUBESCENS Tul. Tav. CXII f. 1.

ItaL. Trifola falsa. Volg. Panedei, Panediei (Val di Non). Ted. Röhliche falsche Trüffel.

Ha forma ovale o globosa, circoscritta da una corteccia (peridio) tenue, di colore da prima bianco, poi giallastro, con tinta qua e là olivacea, al tatto o anche all'aria diventante rossastra, percorsa specialmente alla base da fibrille o vene e in età sceropolata o areolata; sostanza interna compatta, durezza, cellulosa, da prima bianca, poi citrina, indi olivacea; le cellule sono rivestite dai basidii, di forma clavata, 20-25 \times 7-8 μ , portanti all'apice dalle due alle otto spore allungate, 7-9 \times 3-3 $\frac{1}{2}$ μ .

Crece a grandi famiglie, da prima sotto terra, poi quasi intieramente allo scoperto, nei boschi di pino (*Pinus silvestris*), dal maggio al novembre.

È fungo *mangereccio* d'assoluta innocenza, ma di qualità ordinaria per la carne poco gustosa e piuttosto tenace. Da noi generalmente viene mangiato crudo dai ragazzi che vanno al pascolo o a raccogliere legne.

Spiegazione delle figure: *a* Gruppo di due funghi perfettamente sviluppati. *b* Fungo sezionato verticalmente. *c* Basidii. *d* Spore.

III. DISCOMICETEE.

Famiglia delle Elvellacee.

Genere *Morchella*.


Funghi carnosoceracci, con mitra (cappello) e gambo, senza anello e volva; mitra internamente vuota, attaccata al gambo o saldata allo stesso per una piccola vallicella, di forma obovata, alveolata; alveoli di varia grandezza, rivestiti dall'imenio; gambo centrale, vuoto; aschi cilindrici, a otto spore, con parafisi; spore di tinta giallognola, lisce, ellittiche.

MORCHELLA ROTUNDA Pers. Tav. CIV.

Ital. Spugnola gialla, Tripetto, Bucherello. Volg. Spongiosa, Spengigneura, Spunzola. Franc. Morille ronde. Ted. Runde Speisemorchel.


Ha mitra (cappello) di forma globosa, ovata o più raro ovato conica, tutta coperta di alveoli poligonali, di colore giallo-ocra più o meno carico, internamente cava, attaccata al gambo, il quale è cilindrico, alla base sovente bulboso e scanalato, di colore bianco pallido, internamente cavo e cosperso di fiocchi farinosi come pure l'interno del cappello; la carne è bianca, ceracea, fragile, di sapore ed odore non marcato; aschi (teche) cilindrici, pedicellati; 350-400 16-24 μ ; parafisi ramosi, coll'apice clavato, 14-16 μ , largo; spore ellittiche, ialine, 20-23 12-15 μ .

Cresce al margine dei boschi, agli argini dei campi, specialmente in terreno sabbioso, nella primavera. A Trento



Morchella rotunda Pers. (Spugnola gialla)





Morchella deliciosa Fr. (*Spugnola deliciosa*)

Bresadoladis.

Lit. ű. Zippel Trento



si trova al Desert, a S. Nicolò, S. Antonio, Giociadoro ecc. ma in poca quantità.

La Spugnola gialla è uno dei funghi *più delicati e saporiti*, per cui merita d'essere conosciuta e introdotta sul mercato.

Spiegazione delle figure: *a-b* Fungo in vario grado di sviluppo. *c* Fungo sezionato verticalmente. *d* Aschi o teche con 8 spore e parafisi. *e* Spore libere.

MORCHELLA DELICIOSA Fr. - Tav. CV.

Ital. Spugnola deliziosa. Volg. Sponziola, Spongiola. Franc. Morille délicieuse. Ted. Köstliche Morchel.

Ha mitra ovale o ovato-conica, con alveoli allungati di varia dimensione formati da coste longitudinali, pubescenti, che anneriscono coll'età, di colore grigio-fuliginoso o carnicino o giallescente, unita al gambo mediante una piccola vallicella, internamente cava e fioccosa; gambo bianco, eguale, coperto di squamette o fufure che svanisce nel fungo adulto, cavo e fioccoso nell'interno; carne ceracea, fragile, bianca, di odore e sapore appena sensibile; teche cilindriche, pedicellate, 300-350 16-20 μ . con parafisi ramosse; spore ellittiche, 20-26 13-16 μ .

Cresce a grandi famiglie nelle selve di conifere, specialmente nei luoghi erbosi, poco coperti, in primavera.

La Morchella deliziosa si avvicina molto pel gusto e per la tenerezza della carne alla Morchella rotonda; però conviene scegliere esemplari giovani o non ancora del tutto anneriti, altrimenti diventa un po' tenace e indigesta.

Spiegazione delle figure: *a-b* Fungo in vario grado di sviluppo. *c* Fungo sezionato verticalmente. *d* Teche e parafisi. *e* Spore.

MORCHELLA CONICA Pers. - Tav. CVI.

Ital. Spugnola bruna. Volg. Spongiola, Spongigneura, Sponzola ecc. Franc. Morille conique. Ted. Spitzmorchel.

Ha mitra ovato-conica, di colore castagno-fosco o fuliginoso-olivaceo, con alveoli allungato-contorti, nel fondo percorsi da vene trasversali, divisi da coste longitudinali tomentose, di colore fuliginoso, poi nero, internamente cava, fioccosa e secura, alla base congiunta al gambo mediante una vallicella; gambo robusto, pallido, furfuraceo o a piccole squame, rugoso e qua e là solcato, alla base lacunoso, internamente cavo e fioccoso; carne del cappello secura, del gambo bianca, di odore e sapore non marcati; aschi cilindrici, alla base tortuoso-pedicellati, 320-400 18-24 μ . con parafisi ramosi; spore ellittiche, 24-30 14-17 μ .

Cresce a famiglie nelle selve di conifere in primavera.


La Spugnola bruna è di *buon gusto*, ma inferiore alla Spugnola gialla e Spugnola deliziosa. Nel fungo troppo sviluppato la carne diventa tenace, e perciò si devono sempre raccogliere esemplari giovani, ancora interamente vegeti, e rigettare quelli in cui il cappello incomincia ad appassire alla sommità o il gambo prende una tinta giallastra.

Spiegazione delle figure: *a* Cespo di due individui in vario grado di sviluppo. *b* Fungo sezionato verticalmente. *c* Aschi e parafisi. *d* Spore.

MORCHELLA ELATA FR. Tav. CVII.

Ital. Spugnola maggiore. Volg. Spongiola, Sponziola, Spongigneura. Franc. Morille élevée. Ted. Hohe Morchel.


Ha mitra cilindrica, ottusa alla sommità od ovale, con alveoli grandi, allungati, sovente quadrangolari, nel fondo percorsi da vene trasversali, divisi da coste quasi parallele, tomentose, annerantesi nel fungo adulto, di color isabella-sporeo o bruno-alutaceo, attaccata al gambo mediante una vallicella, internamente cava e fioccosa; gambo sovente molto grande, eguale, longitudinalmente a solchi o grinze rugose, forfuraceo-squamoso, di colore pallido o carnicino-




Morchella conica Pers. (*Spugnola bruna*)

Bresadola dis.


Lit. G. Zippel Trento





Morchella elata Fr. (Spugnola maggiore)





Mitrophora hybrida (Sow.) Boud. (*Spugnola minore*)



lurido, internamente cavo e fioccoso, alla base lacinoso; carne ceracea, di sapore mite ed odore un po' nauseante nel fungo adulto; tette cilindriche, alla base tortuoso-pedicellate, 280-400 18-30 μ , con parafisi ramosi; spore ellittiche, 22-32 13-18 μ .

Cresce a famiglie nelle selve di conifere di montagna in primavera.

La Spugnola maggiore è fungo *d'assoluta innocenza*, inferiore però per la carne un po' tenace e per l'odore meno grato alla Spugnola gialla ed alla Spugnola deliziosa, ma ciò non ostante devesi enumerare tra i funghi mangerecci della migliore qualità, come lo sono tutte le altre specie del genere *Morchella*, che qui non descrivo, perchè hanno il medesimo abito e colore e perchè non si possono confondere con specie velenose.

Spiegazione delle figure: *a-b* Fungo in vario grado di sviluppo, *c* Fungo sezionato verticalmente, *d* Aschi e parafisi, *e* Spore.

Genere *Mitrophora*.

Funghi carnosoceracci, con mitra e gambo: mitra campanulata o conica, attaccata al gambo soltanto nella metà superiore, inferiormente libera, alveolata, con alveoli allungati rivestiti dall'imenio come nel genere *Morchella*; gambo vuoto, centrale; aschi cilindrici, a otto spore, con parafisi; spore ellittiche, lisce, di color paglierino.

Dal genere *Morchella* differisce per la mitra semilibera.

MITROPHORA HYBRIDA (Sow.) Boud. (*Morchella semilibera*
e *Morchella rimosipes* De C.) Tav. CVIII.

Ital. Spugnola minore, Volg. Spongiola, Spongiolo, Bissacan. Franc. Morille batârde. Ted. Bastard-Lorchel.

Ha la mitra conica, ottusa, o appuntata all'apice, sotto la metà libera dal gambo, con alveoli di forma irregolare, qua-

drangolare o allungata, nel fondo a vene rialzate, di colore nocciola-scuro, colle coste nereggianti nel fungo adulto; gambo bianco, con tinta paglierina a pieno sviluppo, eguale o bulboso-lacunoso alla base, furfuraceo-squamosetto, longitudinalmente in età grinzoso-soleato, internamente cavo e fioccoso; carne bianca, ceracea, presto molle, acquosa, senza odore e sapore speciale; teche cilindriche, tortuoso-pedicellate, 270-320 - 17-19 μ , parafisi ramosi; spore ellittiche, 23-28 - 13-15 μ .

Cresce a famiglie nei vigneti, agli argini dei campi, nei boschetti a foglia, da marzo a maggio nella zona della vite.

La Spugnola minore è di qualità inferiore alle altre Spugnole per la carne molle, acquosa, e perciò si devono scegliere a preferenza esemplari molto giovani. Il miglior modo di cucinarla si è di friggerla con burro, pepe, sale, prezzemolo e uova.

Spiegazione delle figure: *a* Fungo perfettamente sviluppato. *b* Fungo sezionato verticalmente. *c* Teche e parafisi. *d* Spore libere.


Genere Gyromitra.

Funghi carnosoceracci, con mitra e gambo; mitra irregolare, quasi globosa, con superficie ondolato-eresputa, alla base lobata, coi lobi saldati sul gambo; gambo solido, deforme; imenio disteso su tutta la superficie della mitra, con aschi cilindracei, a otto spore e parafisi; spore ellissoidee biguttulate, ialine.

GYROMITRA ESCULENTA (Pers.) Fr. (*Helvella suspecta* Krombh).

Tav. CIX.

Ital. Spongino, Spugnola bastarda, Volg. Spongiola o Sponziola (Trentino), Spongineura falsa (Milanese), Munneghete (Veneto). Franc. Gyromitre comestible. Ted. Speiseloercher, Verdächtige Lorchel.



Gyromitra esculenta Pers. (Spongino)



Ha mitra irregolare, per lo più di forma rotondata, divisa alla base generalmente in 3 lobi, raramente 4-5, rivolti verso il gambo e saldati allo stesso; la superficie è percorsa da coste tortuose, più o meno rilevate, che si intrecciano dando luogo a lacune o fossette di varia forma, di colore ocraceo-bruno o bruno-rosseggiante; gambo corto, tuberoso, per lo più compresso, lacunoso, coperto da pruina o pelurie, di colore da prima biancastro, poi con tinta carnicina; carne ceracea, di odore grato e sapore meno marcato; aseli cilindrici, pedicellati, 350-450 15-20, con parafisi ramosi; spore ellittiche, a due nuclei oleosi, 20-25 11-14 μ .

Vegeta a grandi famiglie nelle selve di conifere, specialmente in luoghi un po' umidi, sabbiosi, nell'aprile e maggio.

Lo Spongino è fungo di finissimo gusto ed è assai ricercato dai buongustai. Nel Trentino è l'unico fungo che si mangia sotto il nome di Spongiola, ma ne fu proibita la vendita sul mercato di Trento per i casi di avvelenamento da esso prodotti. Ora si vende di nascosto e perciò ogni qual tratto i detti casi si rinnovano.

Dall'analisi chimica fatta sul fungo fresco si constatò che lo Spongino contiene un *veleno* solubile nell'acqua bollente, nell'alcool e nell'etere, che venne chiamato *acido cervello* ($C_{12} H_{20} O_7$), dal quale derivarono gli avvelenamenti successivi. L'effetto del veleno si manifesta soltanto 5-7 ore dopo il cibo con vomito, diarrea, decadimento corporale, e dopo il primo giorno con itterizia generale ed emoglobinuria, per la decomposizione dei globuli rossi del sangue, cui succede la morte per uremia. I casi letali però sono rari potendosi facilmente sospendere l'azione del veleno coi soliti rimedii, specialmente se le persone colpite sono sane e di complessione abbastanza robusta.

Siccome il veleno è solubile nell'acqua bollente, si può cibarsi dello Spongino senza pericolo facendolo da prima bollire nell'acqua e poi, gettata l'acqua, condirlo e cucinarlo coi metodi in uso per gli altri funghi. Seguendo tale norma

io non ebbi mai a soffrire disturbi, quantunque ogni anno ne abbia mangiato, anche in sufficiente quantità. Disseccato riesce pure innocuo, ma conviene conservarlo in luoghi asciutti, giacchè se subentra umidità incomincia a marcire ed allora si sviluppano i veleni che si riscontrano nelle sostanze in putrefazione e ritorna perciò ad essere venefico. Avvelenamenti prodotti dal fungo disseccato ne furono pure constatati, non già prodotti dall' *acido clorico*, ma da formazioni tomaliniche e precisamente dalla *Neurina*, potente veleno che si riscontra appunto nelle sostanze che vanno dissolvendosi. Per questo motivo è da raccomandarsi nuovamente di non raccogliere mai esemplari di funghi che incominciano a marcire, e di conservare sempre i funghi disseccati in luoghi molto asciutti, e quando si prendono per cucinarli rigettare tutti quelli che segnassero un principio di decomposizione.

Spiegazione delle figure: *a-b* Fungo in vario grado di sviluppo. *c* Fungo sezionato verticalmente. *d* Teche e parafisi. *e* Spore libere.

IV. TUBEROIDEE.

Famiglia delle Tuberacee.

Genere Tuber.

Funghi sotterranei, carnosio-ceracei, di forma globosa, più o meno irregolare, con peridio tuberculato o liscio; gleba (interno) compatta, di diverso colore giusta l'età, marmorata da vene bianche formate da un tessuto a cellule allungate; spazio tra le vene costituito dall'imenio con aschi otricolari, contenenti da 1-8 spore; spore globose, quasi globose o ellittiche, *giallastre*, con episporio aculeato o reticolato.

TUBER MELANOSPORUM Vittad. Tav. CXII. fig. 2.

Ital. Tartufo nero. Trifola nera. Volg. Tartufole, tartufole (Trentino), Asteng (Milanese). Franc. Truffe noire. Ted. Gemeine Trüffel, Schwarze Trüffel.

Ha forma globosa o reniforme, sovente lobata o gibbosa, con superficie coperta di verruche poligonali, quasi nere a macchie ferruginose; la sostanza interna è carnosia, da prima bianca, poi rosseggiante, finalmente brunastra o nero-rossastra, marmorata da vene bianche, ramificate, tramandante un odore forte, piccante, abbastanza grato, che aumenta colla maturità e che persiste anche nel fungo disseccato. Detta sostanza è costituita da ife alle cui estremità si sviluppano delle tefhe o aschi di forma otricolare, della dimensione di

69-75 69-63 *u.*, le quali contengono da 1-4 spore, ellittiche, aculeate, gialle, poi brune, 27-52 \approx 23-33 *u.*

Cresce a famiglie nei boschi di quercia sotto terra a profondità variabile, e viene scavato dall'autunno alla primavera.

È il Tartufo più frequente nel Trentino e uno dei più prelibati.

Molte sono le specie *mungerecce* di tartufo e nessuna ve n'ha che sia veramente comprovata venefica. Sul mercato di Trento ne vidi portate soltanto cinque, cioè il *Tuber aestivum*, *Tuber brumale*, *Tub. mesentericum*, *Tub. melanosporum* e *Tub. uncinatum*. Ho dato la figura di una sola specie ritenendola più che sufficiente ad offrirci una idea di codesti distinti muceti che giustamente furono chiamati il *diamante della cucina*, perchè hanno aroma perfetto, inimitabile, sapore squisito, riescono di digestione facile ed offrono una nutrizione più completa che qualunque altro vegetale. La composizione chimica ci dà per il Tartufo nero: azoto 1.350, carbonio 9.450, grasso 0.560, acqua 72.000. Per coste loro qualità furono in pregio già dall'antichità. Gli Ateniesi li stimarono al punto di conferire il diritto di cittadinanza, onore altissimo, ai figli di Cherippo per avere costui inventato una nuova maniera di cucinare questi preziosi commestibili. I Romani li ritiravano in gran copia dalla Libia, e Celio Apicio nel suo trattato *De obsoniis et condimentis* ci insegna come venivano conservati e preparati per le mense luculliane dei dominatori del mondo.

Ora i metodi di cucinatura furono in parte modificati conforme i gusti e le usanze nazionali. Ne accenneremo qui alcuni dei più pratici.

Ragout di Tartufi. Si lavano bene i Tartufi con spazzolino per poter estrarre la terra che c'è tra le verruche, (non si devono mai mondare, perchè perdono molto di sapore che è specialmente prodotto dalla corteccia), poi si collocano

nell'olio e si lasciano finchè ne sono imbevuti, indi si tagliano a fette della grossezza d'una schiena di coltello e si pongono in una cazzeruola con olio o burro, sale, pepe, un poco di vino bianco e si mettono al fuoco. Alcuni vi aggiungono anche sardella e cipolla. Dopo un' ora circa di cottura vi si aggiunge del sugo di limone e si servono.

Tartufi cotti sotto la cenere. I Tartufi ben lavati e spazzolati si cospergono di sale e pepe, poi si involgono in fette di lardo, indi in fogli di carta duplicati e un po' bagnati e si fanno cuocere per un' ora sotto la cenere ben calda. Quando si prendono fuori, si leva loro la carta, si nettano e si servono in tavola sopra una salvietta piegata.

Tartufi all'italiana. Puliti i Tartufi si tagliano a fette e si pongono in una cazzeruola con olio, sale, pepe, prezzemolo, porro o aglio. Si lasciano un po' sopra della cenere calda indi si cuociono a lento fuoco e prima di servirli si cospergono con sugo di limone. Alcuni vi aggiungono del vino bianco e del brodo, a cui sia levato il grasso.

Tartufi alla piemontese. Si pongono i Tartufi nell'olio e vi si lasciano finchè ne sono imbevuti, indi si tagliano a fette e si collocano a strati in un piatto d'argento: ogni strato si cosperge d'olio, sale, pepe e formaggio parmigiano grattugiato, indi si mette il piatto sopra cenere molto calda. Un quarto d'ora basta per la cottura.

Tartufi alla parmigiana. Si pongono i Tartufi affettati in teglia con olio e burro in parti eguali e si lasciano soffriggere cinque minuti: vi si aggiunge sale, pepe e parmigiano grattugiato, e si fan cuocere altri cinque minuti e si servono all'istante.

Tartufi alla Rossini. Si mette in una insalatiera dell'olio fino, senape, aceto, sale, pepe e un po' di sugo di limone e si sbatte il tutto bene fino alla perfetta combina-

zione, indi vi si aggiungono i Tartufi finamente tagliati che si mescolano insieme e si servono. Quest'insalata riesce a preferenza col Tartufo bianco (*Tuber magnum Pico*), il quale non fu finora ritrovato nel Trentino, ma invece è comune in Lombardia e Piemonte.

Spiegazione delle figure: *a* Fungo di grandezza naturale, perfettamente sviluppato. *b* Fungo sezionato verticalmente. *c* Aschi o teche. *d* Spore libere.



Indice alfabetico dei nomi scientifici e delle tavole.

	Fig.	Tav.
<i>Agaricus</i> <i>albello</i> De C.	41	XXVIII
<i>attenuatus</i> De C.	83	L
<i>Brigantii</i> Fr.	83	L
<i>Cardarella</i> Fr. var.	53	XLII
<i>causetta</i> Barla	30	XVI
<i>codescens</i> Viv.	46	XXXIV
<i>cylindraceus</i> De C.	83	L
<i>effocatus</i> Viv.	48	XXXVI
<i>Ergyji</i> De C. var.	53	XLII
<i>exquisitus</i> Vitt.	87	LII
<i>fulvus</i> Schaeff.	27	XII
<i>gambosus</i> Fr.	44	XXVIII
<i>grammopole</i> Bull.	44	XXXI
<i>laeris</i> Krombh.	29	XV
<i>leucothites</i> Vitt.	29	XV
<i>nebrodensis</i> Fr.	53	XLII
<i>Orcella</i> Bull.	80	XLVII
<i>pioparello</i> Viv.	83	L
<i>plumbeus</i> Schaeff.	27	XII
<i>pubicus</i> Fr.	83	L
<i>Schoderi</i> Kschbr.	29	XV
Amanita <i>aspera</i> Fr.	26	XI
<i>caesarea</i> Scop.	18	I
<i>Mappa</i> Batsch	21	V
<i>muscaria</i> Linn.	22	VI
<i>ovoidea</i> Bull.	18	II
<i>phalloides</i> Fr.	23	VII
<i>pantherina</i> De C.	19	III
<i>rubescens</i> Fr.	24	IX
<i>solitaria</i> Bull.	23	VIII
<i>spissa</i> F.	25	X
<i>strobiliformis</i> Vitt.	23	VIII
<i>vaginata</i> Bull.	26	XII
<i>verna</i> Bull.	20	IV
Armillaria <i>aurantia</i> Schaeff.	31	XVIII
<i>caligata</i> Viv.	31	XVII

	Pag.	Tav.
<i>Armillaria imperialis</i> Fr.	32	XIX
<i>mellea</i> Wahl.	31	XX
<i>robusta</i> Alb. et Schw.	30	XXV
<i>Boletus acreus</i> Bull.	99	LXXXIX
<i>calulis</i> Bull.	98	LXXXVIII
<i>elegans</i> Schum.	96	LXXXVI
<i>granulatus</i> Linn.	97	LXXXVII
<i>luridus</i> Schaeff.	100	XCI
<i>luteus</i> Linn.	95	LXXXV
<i>Satanas</i> Lenz.	99	XC
<i>scaber</i> Fr.	101	XCII
<i>versipellis</i> Fr.	102	XCIII
<i>Cantharellus aurantiacus</i> Wulf.	73	-
<i>cibarius</i> Fr.	73	LXXX
<i>clavatus</i> Pers.	74	LXXXII
<i>lutescens</i> Pers.	74	LXXXI
<i>Quéletii</i> Fr.	73	-
<i>Clavaria aurea</i> Schaeff.	108	CII
<i>botrytis</i> Pers.	109	CI
<i>flava</i> Schaeff.	110	C
<i>pallida</i> Schaeff.	110	-
<i>rufescens</i> Schaeff.	110	-
<i>Clitocybe candida</i> Bres.	51	XL
<i>cartilaginea</i> Bull.	48	XXXVI
<i>cinerascens</i> Bull.	47	XXXV
<i>conglobata</i> Vitt.	46	XXXIV
<i>connata</i> Schum.	48	XXXVII
<i>ericetorum</i> Fr.	56	-
<i>geotropa</i> Bull.	50	XXXIX
<i>infundibuliformis</i> Bull.	49	XXXVIII
<i>nebularis</i> Batsch	45	XXXIII
<i>Clitopilus prunulus</i> Scop.	80	XLVI
<i>Collybia dryophila</i> Bull.	52	XLJ
<i>Coprinus atramentarius</i> Bull.	92	LVI
<i>Cortinarius firmus</i> Fr.	86	LVII
<i>Craterellus coriaceopoides</i> Pers.	75	LXXXIII
<i>Eutoloma clypeatum</i> Linn.	79	XLVI
<i>Gomphidius glutinosus</i> Schaeff.	95	-
<i>maculatus</i> Scop.	95	--
<i>roseus</i> Fr.	95	-
<i>viscidus</i> Linn.	94	LVIII
<i>Guepinia rufa</i> (Jacq.) Pat.	111	CIII
<i>Gyromitra esculenta</i> (Pers.) Fr.	120	CIX
<i>Helvella suspecta</i> Krombh.	120	CIX
<i>Hydnum imbricatum</i> Linn.	106	XCVIII

	Pag.	Pag.
Hydnum repandum Linn.	107	XCIX
Hygrophorus crubescens Fr.	37	—
<i>niveus</i> Scop.	56	—
<i>pratensis</i> Pers.	55	LIX
<i>virginicus</i> Wulf.	55	LX
Hypoloma fasciculare Huds.	35	—
Lactarius aurantiacus Pers.	58	LXIII
<i>controversus</i> Pers.	56	LXI
<i>deliciosus</i> Linn.	59	LXIV
<i>insulsus</i> Fr.	57	LXII
<i>piperatus</i> Linn.	51	—
<i>Porninae</i> Roll.	58	LXIII
<i>sanguifluus</i> Paul.	60	LXV
<i>vellerens</i> Fr.	62	LXVII
<i>volemus</i> Fr.	61	LXVI
Lepiota excoriata Schaeff.	28	XIV
<i>nancina</i> Fr.	29	XV
<i>procera</i> Scop.	27	XIII
Lycoperdon Bovista Linn.	112	CX
<i>caelatum</i> Bull.	113	CXI
Marasmius orcadis Bolt.	76	LXXXIV
Mytrophora hybrida (Sow.) Boud.	119	CVIII
Morchella conica Pers.	117	CVI
<i>deliciosa</i> Fr.	117	CV
<i>elata</i> Fr.	118	CVII
<i>rimosipes</i> De C.	119	CVIII
<i>rotunda</i> Pers.	116	CIV
» <i>semilibera</i> De C.	119	CVIII
Pholiota Aegirita (Porta) Brig.	83	L
<i>caperata</i> Pers.	81	XLVIII
<i>mutabilis</i> Schaeff.	85	LI
» <i>praecox</i> Pers.	82	XLIX
Pleurotus fuscus (Batt.) Bres.	53	XLII
» <i>ostreatus</i> Jacq.	54	XLIII
Polyporus asprellus Lev.	104	XCV
<i>Barrelieri</i> Viv.	105	XCVII
Polyporus confluens (Alb. et Schw.) Fr.	104	XCVI
<i>frondosus</i> (Fl. D.) Fr.	105	XCVII
»		XCVII bis
<i>ovinus</i> (Schaeff.) Fr.	103	XCIV
» <i>Pes-caprae</i> Pers.	104	XCV
» <i>scobinaceus</i> (Cum.) Bres.	104	XCV
Psalliota arvensis Schaeff.	87	LII
<i>campestris</i> Linn.	88	LIII
» <i>var. aedulis</i> Vitt.	90	LIV

	Pag.	Tav.
<i>Psalliota pudica</i> Viv.	91	LV
<i>Rhizopogon rubescens</i> Tul.	115	CXII, f. 1
<i>Russula adusta</i> Fr.	69	LXXXVI
<i>aurata</i> Fr.	71	LXXXVIII
<i>cyanoxantha</i> Schaeff.	66	LXXI
<i>delica</i> Fr.	63	LXVIII
<i>emetica</i> Fr.	67	LXXIII
<i>grisea</i> Pers.	70	LXXVII
<i>integra</i> Linn.	68	LXXIV
<i>lepida</i> Fr.	65	LXX
<i>lutea</i> Fr.	72	LXXXIX
<i>rubra</i> Fr.	65	—
<i>sanguinea</i> Bull.	65	—
<i>vesca</i> Fr.	66	LXXII
<i>veternosa</i> Fr.	69	LXXXVI
<i>virescens</i> Schaeff.	64	LXIX
<i>Tricholoma acerbum</i> Bull.	36	XXI
<i>album</i> Schaeff.	44	—
<i>enista</i> Fr.	44	XXXI
<i>Columbetta</i> Fr.	38	XXIII
<i>Georgii</i> Chus.	41	XXVIII
<i>goniospermum</i> Bres.	42	XXIX
<i>grammopodium</i> Bull.	44	XXXII
<i>graveolens</i> Pers.	42	—
<i>nudum</i> Bull.	43	XXX
<i>Russula</i> Schaeff.	37	XXII
<i>sulphureum</i> Bull.	40	XXVII
<i>terreum</i> Schaeff.	38	XXIV
<i>tigrinum</i> Schaeff.	39	XXV
<i>virgatum</i> Fr.	40	XXVI
<i>Tuber aestivum</i> Vitt.	124	—
<i>brunale</i> Vitt.	124	—
<i>melanosporum</i> Vitt.	123	CXII, f. 2
<i>mesentericum</i> Vitt.	124	—
<i>uncinatum</i> Chat.	124	—
<i>Volvaria glojoccephala</i> De C.	78	XLV
<i>speciosa</i> Fr.	77	XLIV



INDICE ALFABETICO

dei nomi italiani, volgari, francesi e tedeschi.

	Pag.		Pag.
Acerbe	36	Agarico imperiale	31
Agarie araigneux	86	montano	44
atramentaire	92	nebuloso	45
cartilagineux	18	nudo	43
changeant	85	primaticcio	82
cinerescent	47	ranciato	31
drapé noir	38	robusto	30
ficoïle	55	terreo	38
géotrop	50	tigrato	39
grammopode	44	vergato	40
nebuleux	45	zoffino	40
nu	43	Alberello	101, 102
rameux	48	Ampezzanerschwämme	53
ridé	81	Ansehnlicher Blätterschwamm	77
tigré	39	Asteng	123
vergeté	40	Avvinato	37
Agarico acerbo	36	Barbescin	105
a cespuglio	46	Barbon	104
amaro	35	bianco	107
a piede striato	44	mato	106
a spore angolate	42	Bastard-Lorchel	119
avvinato	37	Bisette	29
bianco	44	Bis-sacau	119
calzato	31	Boîè porcîn	98
candido	51	Boîèt	17
cartilaginoso	48	Boleto elegante	96
cenerognolo	47	giallo	95
clipeato	79	granuloso	97
colombetta	38	hrido	100
congiobato	46	Satana	99
comato	48	scabro	101
driofilo	52	Boule de neige	87
geotropo	50	Bragaldo rosso	17
grinzoso	81	Brasca	56
imbuto	49		

	Pag.		Pag.
Branner Wulstblätterschwamm	26	Chantarelle pourpre	74
Brätling	61	Charbonnier	66
Brisa	98, 99, 101	Chiodello	91
falsa	95	Ciate d'ors	108, 109, 110
matta	99, 100	* de castagnar	105
mora	98	Ciodeti	82
rossa	102	Ciodeto	91
Brise matte	31	Ciodini de morer	31
Brisoto	98, 101	Ciodo	94
Broche	85	Citronengelber Blätterschwamm	21
Brochete	85	Clavaria botrite	109
Bronzpilz	99	Coco bianch	18
Brütling	59	bon	17
Bubbola buona	28	Colombetta	38
maggiore	27	Colombette	38
Bubbolina rigata	26	Colombina	26
Bucharello	116	bianca	63
Butterpilz	95	maggiore	66
		rossa	67
		e dolec	65
Calzetta	31	* e gialla	69
Canarello giallo	74	verde	64
violaceo	74	Coprino atramentario	92
Capo gallo	73	Coralloïde jaune	108
Cardella	54	oeracée	110
Carnio	36	* pourpre	109
Carniol roân	37	Cortinario compatto	86
Carpanote	98, 99	Croquette des sapinières	103
Causetta	31	Concoumelle grise	26
de Nice	31	orangée	26
Cavarese	38	Conlemelle chauve	28
Ceppatello buono	98	Conlenvrille	27
Cèpe	98	Coupe bocagère	49
bronzé	99	Didele	108
du diable	99	Ditola dorata	110
élégant	96	gialla	108, 109, 110
gris	101	* rosso-gialla	109
jaune	95	Doga	55
orangé	102	Drehling	54
perfide	100	Ehegürtel	87
* pleureur	97	Emétique	67
Correna	54	Erdfarbiger Blätterschwamm	38
Champignon de Couce	88	Essbarer Täubling	66
du peuplier	83		
Chantarelle	73		
jaunâtre	74		

	Pag.		Pag.
Falso Farinaccio	26	Fungo Mugnaio	55
Famiglia buona	31	della rugiada	28
Chanterelle	73	della saetta	41
jannâtre	74		
Famigliuola gialla	85	Galetto	73
Farinaccio	18	Gallinaccio	73
Farinon	18	spinoso	107
Fausse Mousseron	76	squamoso	106
Oronge	22	Gambe secche	76
Souchette	52	Gelber Röhrenschwamm	96
Felengo	53	Gelber Stengelschwamm	108
Finferla	74	Gelber Täubling	72
Finferlo	73	Gelber Trichterschwamm	49
Fliegenschwamm	22	Gelbiger Faltenschwamm	71
Fong dal Pin	59	Gelone	54
sangue	60	Gemeiner Champignon	88
de albera	83	Gemeine Trüffel	123
de la rosada	88	Geschundener Blätterschwamm	28
del Lares	58	Getiegerter Blätterschwamm	39
delle caure	95	Goldfarbener Täubling	71
della salezza	92	Goldgelber Korallenschwamm	110
delle vacche	97	Graublauer Täubling	66
de prà	88	Grauer Täubling	70
de salgar	83	Griffo	105
ferré	98, 99	Griffone	104, 105
gato	105	Grisette	26
Foughi del morar	34	Gros-clou-rouge	94
della saetta d'auton	44	Grumato grigio	80
marzoi	82	Grünlicher Knollenblätterschwamm	49
Fungo barbòn	104	Grünlicher Täubling	64
della doga	55	Guepinia rossastra	111
del Monte Brione	50	Guepinie rougeâtre	111
del pan	104	Gyromitre comestible	120
di Penede	42		
Ovo	17	Hallimasch	34
Frühschwamm	82	Hasenöhrl	74
Fungo color d'Isabella	76	Hasen-staubpilz	113
della Bellamonte	53	Herbstmousseron	76
del lievito	80	Herisson	107
d'Ampezzo	53	gris	106
della Ferula	53	Herrenpilz	98
» Rosa	88	Hexenschwamm	100
» di gelatina	111	Hirschschwamm	106
di pioppa	83	Hohe Morehel	118
» imperiale	105		

	Pag.		Pag.
Igrotoro pratense	55	Muneghete	120
lubuto	49	Musseron	41
Ludenschwamm	100	Nackter Blätterschwamm	29
Lungferschwamm	55	Ockerbrauner Blätterschwamm	52
Kaiserling	17	Oeuf bianch	18
Kapuzinerpilz	101	Oladivo	80
Klapperschwamm	91	Oreellas Blätterschwamm	80
Klebiger Blätterschwamm	105	Oreade	76
Köstliche Morchel	117	Oreille de peuplier	51
Kreispilz	97	Orgel	51
Kühpilz	97	Orletto	36
Lactaire à suc rouge	60	Oronge âpre	26
orangé	58	blanche	18
rnbanné	57	citrine	21
Lapacendro buono	59	panthère	23
sanguigno	60	perlée	25
Lattario lanuto	62	printanière	20
ranciato	58	solitaire	23
Ledergelber Täubling	69	verte	19
Legorât	101	vineuse	21
Legorsela	98	vraie	17
Lievitato	80	Padoan bianco	36
Lingna di brughiera	101	rosso	37
Loffa	112	Palomet	64
Lycoperdon eiselé	113	Pamarola fumola	66
géant	112	rossa	67
Maggengo	41	Panedei	115
Maischwamm	41	Pantherschwamm	23
Manine gialle	108, 110	Parasole	27
rosse	109	Parasolschwamm	27
Marzuolo	82	Paste	80
Mazza da tamburo	27	Pastine	80
Morette	38	Pellicione	27
Morille batârde	119	Pepino strisciato	57
conique	117	Perlenschwamm	24
délicieuse	117	Pett de lof	113
glévée	118	Petto di lupo	112
ronde	116	Peveraccio	56
Moscario	22	giallo	61
Monsseron	41	Peverone	56
d'automne	80	Pfifferling	73
des haies	79	Pied de mouton noir	104

	Pag.		Pag.
Pinzzo buono	97	Rossola iridescente	66
Piopperello	83	" languente	69
Pioppino	83	" lepidi	65
Pisciacani	92	" maggiore	66
Pivouale	83	" Rother Taubling	68
Poivré montonné	62	" Rothkopf	102
" rose	56	" Röthliche Bärentatze	109
Poliporo confluyente	101	" Röthliche falsche Trüffel	115
" frondoso	105	" Rouget	37
" ovino	103	" Rougillon	69
Polypore en bouquet	105	" bâtard	68
" groupé	104	" comestible	66
Porcinello	101	" doré	71
" ranciato	102	" gris	70
Porcino	98	" jaune	72
" malefico	99	" Rougillon languissant	69
" nero	99	" pourpre	65
Prataiuolo	88	" Runde Speisemorchel	116
" edule	90	" Runzlicher Blätterschwamm	81
" maggiore	87	" Satanspilz	93
" piccolo	91	" Sanguinol	59, 60
Précoce	82	" Sanguin	59
Pressanella	98	" Schafstuter	103
Prévat	63	" Schuppiger Fliegenschwamm	26
Prugnolo	11	" Schwarze Trüffel	123
" bastardo	80	" Seidenglänzender Blätterschwamm	38
" nostrale	41	" Semmelpilz	101
Reccia de lever	111	" Sfogatello	48
" de morar	54	" Stoffa	112, 113
Reclagna	111	" " d'Ors	112, 113
Rei-sger	59	" Sottana	56
Ricchione	54	" Speisemorchel	120
Robuste	30	" Speitäubling	67
Rosen-Täubling	65	" Spinarolo	41
Rossetta	67	" Spongino	120
Rossin	102	" Spitzmorchel	117
Rossling	41	" Spongigneura	116, 117, 118
Rossola alutacea	69	" " falsa	120
" buona	68	" Sponziola	116, 117, 118, 119, 120
" delica	63	" " de castagnar	105
" dorata	71	" Sponziola	117, 118, 120
" edule	66	" Spugnola bastarda	120
" gialla	72	" " bruna	117
" grigia	70	" " deliciosa	117

	Pag.	Pag.
Spagnola gialla	116	Todtentrompette 75
maggiore	118	Trifola falsa 115
minore	119	» nera 123
Spinzola 116, 117,	118	Tripetto 116
Starker Blätterschwamm	30	Trombetta da morto 75
Steccherino bruno	106	Trompette de morts 75
dorato	107	Truffe noir 123
falso	106	Uovolo 1
Steinpilz	98	Uovolo bianco 1
Stockfänbling	37	malefico-rosso 22
Stoppelpilz	107	Vachette 61
Sulphurin puant	40	Verdächtige Lorchel 120
Süssling	107	Verdone 64
Tajadelle	109	Vescia arcolata 113
Tartrifole	123	maggiore 112
Tartufole	123	Vessa 112
Tartufo nero	123	Virginal 55
Tête de Méduse	34	Volvaire blanche 77
Tignosa aspra	26	» grise 78
bianca	23	Volvaria bianca 77
bigia	23	fuliginosa 78
di primavera	20	Wandelbarer Blätterschwamm 85
dorata	22	Weisser Knollenblätterschwamm 20
pagliata	21	Weissmilchender Gift-Reizker 57
screziata	25	Wiesenschwamm 55
verdognola	19	Wollschwamm 62
vinata	24	Zaldi 73
Tobbia	27	Zonàti 46
Tobbietta	28	
bianca	29	

PUNTO INTERNO CIVIL

SOVIAVA...
DISORDINI... SUPPLEMENTO

ANNO 3 BRUCIOLO

1918

...S... ..

... ..

... ..

1918

1918

(2) riserva... ..

- CAVARA F. **Funghi mangerecci e funghi velenosi.** 1897, di pagine xvi-192 con 43 tavole cromolitografiche e 11 incisioni [*Manuali Hoepli*] L. 4.50
- Annuario del Reale Istituto Botanico di Roma** redatto dal prof. R. Pirota, direttore, 1884-1889 7 volumi in-4, illustrati L. 267.—
- Atlante Botanico** ordinato secondo il sistema naturale di D. Candolle, 80 tavole con 482 figure a colori e 726 incisioni intercalate nel testo per G. BRIOSI, 1899, in-4, 2.^a edizione rifatta, accresciuta e corretta, colla collaborazione di RODOLFO FARNETI. Legato elegantemente L. 28.—
- BALDINI T. A. **Il mondo vegetale** descritto e illustrato, con prefazione del prof. R. Pirota, 1897 in-8 grande, di pag. vi-150, con 600 figure e 124 tavole a colori. Elegantemente legato in tela e fregi oro e colori L. 15.—
- BUBANI P. **Flora Pyrenea** per ordines naturales gradatim digesta. Opus posthumum editum curante O. Penzig in Athenaeo Genuensi Botanices Professore. Volume primo, 1897 in-8 gr., di pag. iv-554 L. 20.—
- CESATI V. **Stirpes italicae** rariores vel novae descriptionibus iconibusque illustratae. 1840-43, 3 fascicoli, con 28 tavole e 3 tavole in fac-simile, in fol. grande L. 30.—
- **Mycetum in itinere** Bornensi lect. a Beccari enumeratio. 1879, pag. 28, con 4 tavole in parte colorate L. 7.50
- **Saggio** di una bibliografia algologica italiana. 1882, pag. 77, in-4. L. 6.—
- MONTEMARTINI L. **Fisiologia vegetale.** 1898, di pag. xvi-230, con 68 incisioni [*Manuali Hoepli*] L. 1.50
- TOGNINI F. **Anatomia vegetale.** 1897, di pagine xvi-274, con 141 inc. [*Manuali Hoepli*] . . L. 1.50

